


2. 落葉催花：於雙十節前後一週，使用速滅松乳劑或甲基巴拉松乳劑400~500倍液，加愛多收 400倍液，再加萘乙酸 200ppm液行葉面噴施，處理後1~2週，須全園灌水，並經常保持濕潤狀態，約經2週，部分葉片黃化脫落，花芽萌發。果實可望在2、3月間收穫，價格甚高。

**防止荔枝落果：**栽培荔枝常有落花率和落果率過高的煩惱，噴施2,4-D可減輕落果。當幼果如豆大時，噴5~10ppm 2,4-D液於全樹，隔一週，再噴一次，共噴二次，可減少落果一半。又為促進荔枝果實發育，在幼果時噴100ppm 吲哚丁酸液，也頗有效於防止落果，並增大果粒。

**化學整枝：**果樹整枝時主枝和主幹的分枝角一定要大，則當樹上結滿果實時，不致因不勝負荷而於分枝處裂折。本省果農習慣上用繩索拉下主枝，固定於地上，使主枝與主幹成40~50度角，此項手續不但費工費事，也妨礙果園作業之進行，現在可以利用生長調節劑處理使分枝角增大了。在整枝時，主幹截頭後之切口，用調和250~1,000ppm 吲哚丁酸的羊毛脂塗抹，則切口下方枝梢都斜生成一廣分枝角，不需拉枝了。其他生長調節劑如阿拉、益收、三碘安息酸 (Triiodobenzoic acid) 等如在春季適當時期施用，也可使幼樹產生理想分枝角，其濃度：阿拉 500ppm

、益收300~500ppm、三碘安息酸 50ppm，當新梢長15~20公分時噴佈。

**果園除草：**植物生長調節劑中用於果園除草者祇有2,4-D，它是一種奧克新，當濃度低時有促進生長，防止落果之效，此時濃度約為3~5ppm；濃度高時可殺死闊葉草，凡雙子葉雜草，皆可被殺死，但對禾本科雜草無效，除草用濃度為每公頃用有效成份1.1~2.2公斤，加水噴於地面。2,4-D對柑桔等果樹的嫩葉，引起藥害，所以柑桔園不能用它除草。



甲·果苗定植後在A處剪定  
乙·切口塗抹含吲哚丁酸的羊毛脂  
丙·次年春季五芽萌發成枝，分枝角增大，虛線示若不處理之分枝角度




全國唯一機種最多的搬運車製造廠

• 經政府檢定合格 •

# 必翔搬運車

好車就是好車！

操作簡易  
乘坐舒適  
鋼板避震  
轉彎最小  
性能最優  
安全性高  
外型美觀  
用途最廣  
機型最多



\* 徵求全省經銷商

本公司專業生產適合各行業使用之搬運車，各種大小機型均有生產  
必翔實業有限公司 電話：(035)516797-8 · 516258  
新竹縣新豐鄉上坑村坑子口169號