

但球莖的收穫量，以混合藥劑處理的比單獨使用「您好」好得多。不管單獨使用或混合使用，都遠比沒有處理任何藥劑者佳，防治率也約為50%，且切花品質處理者也較佳。

「瑞香草酚」(thymol) 1,000倍可以抑制軟腐細菌的繁殖，但以此藥處理時間，不宜超過30分鐘，否則容易發生藥害。銅劑(銅氧化銅)如「果菜多」(Kocide) 1,000倍可以抑制軟腐細菌與疫病菌。由以上的藥劑，我們可以選擇要預防的對象，而加以混合使用，以達到不發病或減少發病的最後目的。

土壤處理 適用於盆栽用土


單獨靠處理土壤來防治種球傳播性病害是不夠的，如種球沒有經過處理，就種在沒有病菌的土壤，不但不能防病，反而可能加重病害的發生。

土壤處理最適合盆栽用土，可用蒸氣、「氯苦」(Chloropicrin) 及「福爾馬林」(formalin) 消毒等。種球處理後，種植在消毒過的土壤，當然可

以得到最好防治效果，但生產成本提高很多。

栽培地 排水應良好

栽培地區宜選排水良好的砂質壤土，田畦高度要够，以利排水，地上部發生病徵，應選用適當藥劑防治。盆栽種球花卉，應隨時拔除病株，並避免用噴霧式供水，減少病害的傳播。



獅馬肥料系列

新正光

Cheng Kuang

大補——顧產量！

獅馬超級葉肥®

唯一能被植物完全吸收而速效的結晶狀葉肥。

獅馬3號藍肥®

具速效性與緩效性不含氯，經濟有效。

獅馬露®

最適合於作物營養生長的葉面或土壤施肥。

小補——顧品質！

福翠農®

預防及治療微量元素缺乏症。

福翠農1號®

成份加倍效果加倍。

獅馬液肥1號®

速效性葉面液肥，土壤灌注亦可。



西德獅馬農業台灣分公司
正光化工股份有限公司
台北市松江路87號帝國大廈16樓

TEL: 5618131-5618311

BASF