

=165公斤/公頃，並採用兩種施肥法，即基肥及播種後第25天各施50%氮素（兩次分施），與基肥及播種後第25天各施40%氮素，播種後第40天再施20%（3次分施）。試驗結果得知，不同氮素施用量對以上兩品種的農藝性狀影响很近似，即有效穗數，谷粒蛋白質含量及產量均受氮素用量的影响，隨氮素用量的增

加而增加，但台中選2號的有效穗數及產量對氮素效應較大。（參看表1.）

產量增加

小麥台中31號的氮肥用量，每公頃 125公斤即可

表 1. 氮肥用量及用法對小麥台中31號及台中選2號農藝性狀及品質的平均效應

品 種	氮 素 用 量 法 (公斤/公頃)	有 穗 數 (支/平方公尺)	谷 含 量 (%)	粒 量 (%)	麵 粉 蛋 白 質 含 量 (%)	谷 產 量 (公斤/公頃)	粒 量 (%)
台 中 31 號	N ₁ 85	197	11.42		10.24		2,465
	N ₂ 125	206	11.89		10.74		2,806
	N ₃ 165	226	12.10		10.78		2,823
	兩次分施	209	11.66		10.49		2,699
	3次分施	210	12.02		10.69		2,698
台 中 選 2 號	N ₁ 85	183	11.68		10.10		2,984
	N ₂ 125	215	12.16		10.13		3,189
	N ₃ 165	229	12.34		10.53		3,424
	兩次分施	202	11.67		9.95		3,126
	3次分施	217	12.45		10.55		3,272

誠徵經銷商·說明書來函即寄

和春 中央標準局認定第239535號

活肥源
提高肥效之恩物

田變好田 園變好園

增強肥效
改善土壤疏鬆
促進微量元素吸收
增加糖分·香味
提高品質增加產量

和春讚 大賺錢!!

菸草 茶 菜

和春化工股份有限公司 台中市西區忠明路56號 TEL (04) 2515512, 2514908