



留田莖栽培須保持適當的行株距，以提高產量。

筴的發育生長，如果母莖沒有適當的距離及位置，則易互相疊擠，影響生長，而無法提高產量。因此每年留母莖時，在每一竹叢中，除3年生母莖外，其他2年生母莖的留存以留在竹叢的外圍為宜，且其相互間的距離，儘量採等距離為佳，如此則每隔約5年進行竹園更新一次，則能保持適當的行株距，而達集約栽培之效。

三．母莖留存數量多少

新母莖的培育，以2年生母莖的地下莖的第一層芽體培育而成者為最佳，因此最底層的芽體，將來發育而成的新母莖，其根盤較深，植株不易受風吹而倒伏。相反的如由最上層的芽體所培育的新母莖，其根盤易形增高，則培土、覆蓋較困難，且生產的竹筴產量低、品質差，且整個植株易因強風吹襲而倒伏。在田間由外表判斷所留的新母莖，是否來自2年生母莖

東和農藥 大贈送



贈送辦法：

1. 凡購買東和農藥產品滿500元送毛巾壹條
2. 凡購買東和農藥產品滿1000元送汗衫壹件或毛巾貳條



請至屏東地區東和農藥農友服務中心購買
期間75年8月1日~9月30日止

東和化學企業股份有限公司



專利品

肥料+水

噴肥料・噴水

多功能雙管式噴管

不扭曲・不滾動・不流失

噴肥均勻・提昇施肥效益

三福實業社

台南市府安路6段27巷10號
(06)2581761・2598261

本社最新出版

台灣的野生蘭

(增訂三版)

定價340元

・新增蘭種11屬19種

・彩色圖片全部換新

(郵購另加掛號郵資16元)

主要內容：認識蘭科植物，野生蘭之鑑賞，十步之內必有芳草，野生蘭栽培繁殖，有價值的台灣野生蘭，及蘭科植物形態術語，台灣野生蘭產地氣候，台灣野生蘭栽培法分類概要等，中英文對照。由蘇鴻傑博士編著。

豐年社

台北市溫州街14號
電話 (02) 3938148
郵政劃撥0005930-0