




鯉魚人工繁殖 可用「可助能」處理

問 鯉魚人工繁殖，可以使用何種荷爾蒙處理？何處有售？（桃園縣八德鄉桃鶯路23號呂春暉）


答 (1) 鯉魚人工繁殖必須選擇成熟度良好，腹部飽滿的雌、雄種魚為宜。

(2) 催生劑有數種，目前所使用的「可助能」，台北市南京東路5段16號10樓之1字妙公司（電話02-7608217）有售。鯉魚體重1公克，使用「可助能」1.5IU（國際單位）。（余廷基）

斑節蝦不怕冷 多在秋冬季養殖

問 我與親戚在枋寮鄉合夥養草蝦，數年來不甚理想，成功率偏低。現擬改養斑節蝦，另在潮州想再開拓淡水長腳大蝦。請問淡水長腳大蝦及斑節蝦生長適宜溫度？水溫幾度時冬眠？（高雄市中山二路533號10樓張坤城）

答 淡水長腳大蝦的養殖，在29°C以上最有利，因成長快速。15~20°C能攝食，但增重率降



（阿豐攝）

低。15°C以下，大多不攝食，成長停頓。水溫降至8°C左右，持續多天，就不能忍受而死亡。

斑節蝦最不怕冷，在台灣養殖都在秋冬季節。水溫不會降至冬眠（不攝食）或死亡的程度，所以在日本南部也能養殖。（陳勝香）

蓮霧幹基環傷處理 7月初中旬為最佳時機

問 我種植有8年生的蓮霧，面積0.8公頃，共有103株，每年採收均不甚理想。請問：

(1) 幹基環傷處理前與後到催花處理前，應施用何種肥料？

(2) 黃化劑（Chlorosis）農藥行是否有售？何時可噴施？

(3) 何時是幹基環傷處理的最佳時機？幹基環傷處理，敲頭如何打法？（屏東市自由路114號陳文榮）



（薛聰賢 攝）

答 (1) 幹基環傷處理前後至催花處理前，勿施含氮肥料，僅施磷肥（過磷酸鈣）及鉀肥（如氯化鉀）。

(2) 黃化劑如磷酸一鉀，一般農藥行不售，可向化學原料行洽購。於幹基環傷處理後至催花前，每10~15天噴磷酸一鉀、磷酸一鈣、磷酸鎂及硼砂（酸）各1,000倍1次，以抑制抽梢生長，促進枝、葉成熟老化，以利花芽分化。

(3) 幹基環傷處理最佳時機為，催花處理前1~1個半月（一般於7月初~7月中旬）。於此期間內選新梢生長停止，葉片完全展開時，行幹基環傷處理為最佳時機。

幹基環傷處理法有，剝皮、綁鐵絲、刀砍（割）及敲頭等不同方法。敲頭是用小鐵錘敲打樹皮（韌皮部），使破碎，但不使脫落為佳。（王德男）