



常由於灌水時人為的疏忽，水分未充分滲透全畦面時即予排水，造成中間行之植株生育較差，進而影响產量及收益，畦面覆蓋塑膠布後更須注意，此時欲判斷水分是否足夠，可由中間行定植穴觀之或以手觸摸感覺；另外，土壤若太過於粘重或透水性差者，不宜採用三行式，應以雙行式為宜。

以上數點須在選擇採用何種密植法之前審慎考慮，定植後之田間管理則須小心謹慎，致於其他田間管理方法則與一般者相同。


其他

1. **開花期**：草莓種苗若非高冷地育苗或經過其他特殊處理，則開花期與一般行株距者相同，並不會因為密植而提早或延後開花。

2. **果實大小**：經過桃園農改場3年試驗結果，平均單果重不受栽植密度大小的影响，只要管理良好，肥份充足，將可生產更多的優良鮮果。

3. **先覆蓋再定植**：桃園農改場進行3年試驗均採用此法，將每分地所須的雞糞300公斤及43號複合肥

料100公斤，全面撒施後即行整地耕耘做畦，再行覆蓋塑膠布，劃定植穴，然後灌水使土壤充分濕潤，第二天即行定植，種苗是用假植苗，定植時根部附帶小土塊，定植後植株生育快速而健壯；北部地區氣溫下降比中南部早，開花結果時植株尚小，影响產量的提高，畦面覆蓋塑膠布後，有保溫作用，促進根部生長，加速植株發育，對增加產量有所裨益，同時不必噴施殺草劑，可降低生產成本，因此，北部地區似可採用此法以節省勞力，降低生產成本，提高產量及收益。但是採用此法須先培育健康的假植苗，否則，採用一般細弱的幼苗，定植後幼苗會暫時的萎縮而與溫度很高的塑膠布表面接觸，發生葉片灼傷、枯乾，影响定植成活率及初期生育，另外，灌水後應於一兩天內定植完成，若延誤時間太長，則土壤結硬密實，透氣性變差，定植後根部生長擴展受阻，植株發育緩慢。



果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!

葉面施肥·亦可混合農藥使用

有機質 磷鉀肥
魚精 開花肥
0-10-10

促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳
花蕾肥碩、開花旺盛——着果良好 結實大

美國ALASKA魚肥公司 出品

果樹·蔬菜用 **花寶(HYPONeX)系列!!**

花寶二號

20-20-20

促進果實肥大 糖度增加

花寶三號

10-30-20

促進開花 增加着果率 結實良好

美國The HYPONeX Co., Inc. 製造

◆詳細資料歡迎函索◆

地面撒佈
使用方便

《最新奇 特殊土壤改良劑》

——改善水果品質的秘方——

促進着色 提早成熟 糖度增加
強健植物生理機能 增強貯藏力

鈣元 CALGEN
カルゲン

日本製造 原廠進口供應

高單位鈣質
改善土壤
控制氮肥
防止徒長

——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——

台灣總代理
總經理

台和園藝企業股份有限公司

Taiwan Horticultural Co., Ltd.

台北市士林區中正路104巷1弄2號

台中連絡處：台中市三民路一段164號

郵政劃撥：0101360-9

電話：(02) 831-3302

電話：(04) 2223374