

對那些產婦在將來希望有小孩，放置避孕器須要特別小心。因為用避孕器者，比不用者更可能產生骨盆腔發炎，而每次發炎都有發展成輸卵管阻塞的可能，甚至造成不孕。

基於這些原因，很多醫生提倡未產婦不要使用避孕器，每個未產婦要放置避孕器前，都須經過專家慎重的選擇才可以。

所有婦女都應該知道年紀愈輕、有複雜的性關係，常常有性傳染疾病的人，她得到骨盆腔發炎的機會是最大的。因此，每個婦女在使用之前都應該衡量用避孕器是不是優點大於缺點？

患有糖尿病的婦女要放置避孕器，需要特別注意，有一些研究顯示，在放避孕器的糖尿病婦女，有比較高的懷孕率及不同的子宮內膜反應，但在其他婦女却沒有任何差異。國際家庭計畫聯盟的醫療顧問小組和大英國家庭計畫學會，在看過很多研究報告後，却認為糖尿病婦女可以使用避孕器，不是一種禁忌。

除了以上，用避孕器的婦女也應該知道下列的事項：

1. 如何檢查避孕器的細線？如

果此細線不見或位置不對，都須請醫生再檢查。

2. 常見的副作用，有流血增加和抽痛。

3. 如果有任何發炎的症狀或徵候——發燒、骨盆腔痛或壓痛、不尋常的流血過多、嚴重的抽筋或太多分泌物，須找醫生診治。

4. 放避孕器懷孕時，可能是子

宮外孕，因此有腹痛和月經沒來的現象都須小心。

5. 如果放避孕器者懷孕了，即使她想繼續保有此小孩，她也要去找醫生。最好是把避孕器拿掉，如果不可能，應告訴她可能會發生敗血性流產的症狀和危險。


6. 知道所放避孕器的種類。

7. 知道換避孕器的時間。

儘可能地，在放置避孕器後3個月，應該重新檢查避孕器有沒有脫位，以後每年檢查1次也是必要的。過了更年期的婦女應該把避孕器拿掉，以免將來因子宮縮小和子宮口狹窄，拿掉避孕器發生困難。



愛書的孩子(張義佩 攝)



請認明

三要素
最均勻
有機質肥料

含有成分：

氮 4.5-5.5%

磷 2.5-3.0%

鉀 1.5-2.0%

有機物 87%

純正

脫棉壓榨

棉子粕

頂新製油實業股份有限公司

榮譽出品

彰化縣永靖鄉永靖街60號

(048) 221166(代表)

台北電話(02) 5613909-5813907

改良土壤
肥効長久

適應作物：

蘋果、梨、葡萄、柑桔、
菸草、茶葉、枇杷、蘆筍、
番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、
甘蔗、番茄、蔬菜、豆類、
花卉、盆栽。