




檸檬銷路 晚春至初夏最佳

問 (1)檸檬果皮粗厚，與品種、氣候、土壤是否有直接關係？

(2)東部北迴歸線地帶的氣候是否適宜栽種檸檬？

(3)檸檬理想砧木為何？

(4)現今檸檬春果市場供需情形如何？農業試驗所於屏東縣長治鄉春果產期調節的模式，是否具有很好的功效？（花蓮縣瑞穗鄉中華路 246巷8號林華松）

答 (1)影响檸檬果皮粗厚的可能原因有2：①瘡痂病（俗稱生角病）引起。②氮肥過多或植株過度徒長，有時鉀肥太多亦會有粗皮現象。

(2)如果管理良好，檸檬在本省平地及低海拔地區皆適宜。

(3)檸檬的砧木，一般使用苦柚，廣東檸檬或粗皮檸檬。苦柚具有喬性砧性質，易引發徒長，且其遺傳性狀不統一，為其缺點。建議採用廣東檸檬或粗皮檸檬，但應注意天牛的發生。

(4)本省檸檬在晚春至初夏期間，常供不應求。夏果則產銷情況不穩定，價格亦不穩定。農業試驗所近年來在屏東地區實施的產期調節模式雖具效果，但其成敗受到氣候條件的左右，主要是受到下列兩項因子



（楊文振 攝）

的限制：①11月時是否為乾旱氣候。如果當時仍為雨季，則不易引發花芽分化。②冬季氣溫是否過低，冬天氣溫太低，易引致落花落果及畸形花，不利於春果生產。（劉邦基）

桃人工授粉 開花後4天內最適

問 溫帶白桃系品種如中津白桃，因缺少花粉，須行人工授粉，促進結果。請問：

(1)人工授粉的適當時期為何？

(2)人工授粉後如遇到下雨，是否須補行1次？（台中縣霧峰鄉中正路 714巷2號劉增順）

答 (1)通常桃子開花後4天內，雌蕊柱頭先端會分泌粘液，而且有光澤，此時授粉能力很強，只要有花粉在柱頭上，就可授粉。4天後，柱頭變成褐



（張瑞卿 攝）

色，先去光澤，就沒有授粉能力了。因此授粉時期要把握恰當。

(2)如果授粉後，經過3小時以上，雖遇到下雨，可以不必補授粉，否則最好再補1次較為保險。

人工授粉是萬不得已的方法，建議用蜂授粉，可以事半功倍。（曾逢星）

三七五耕地繳售稻谷 應由承租人辦理

問 我有1塊三七五保留地出租給某人（佃農）栽種稻谷，田賦及水租（水利會）都是由我繳納。請問這塊地向農會繳的計畫收購及輔導收購的稻谷，是由我（地主）繳，還是佃農繳呢？（苗栗縣西湖鄉西三湖59-2號蘇邱對妹）

答 政府辦理計畫收購及輔導收購稻谷，是以實際從事耕種者為對象。由於承租人（佃農）是實

共有耕地 每人持分達5公頃以上

台北市木柵區木柵路4段78號許再添

先生問：

我有1筆共有土地，坐落台北縣三芝鄉新基隆段二坪頂小段38-1地號，地目旱，面積23公頃6,126平方公尺（我占104/288，持分額達8公頃5,262平方公尺）。都市計劃區段編為保育區用地。共有人15人，除我以外，其他14人均已死亡，而未辦理繼承登記。我有自耕能力，請問我能否以個人名義，自行申請辦理這筆土地的分割，確保我的使用權？

高瑞錚律師答覆：

依都市計劃法編為保護區的田旱地目土地，在法律上仍屬「耕地」的1種（農業發展條例第3條

法律問題解答

可以申請分割

第11款）。

耕地，原則上不得請求分割，但依農業發展條例第30條的規定：「共有耕地每人持分達5公頃以上，且有分割之必要者，得報經該省（市）主管機關核准分割為單獨所有。」所稱省（市）主管機關，是指省（市）政府（見同條例第2條）。

因此，本件土地，尚非不得請求分割。不過，應注意者，將來縱使主管機關核准分割為單獨所有。但分割登記，畢竟須與其他共有人協同為之（土地登記規則第25條），而所指土地其餘共有人均已死亡，所以在辦理分割以前，先須請求各該繼承人辦理繼承登記。

因此，本件土地，尚非不得請求分割。不過，應注意者，將來縱使主管機關核准分割為單獨所有。但分割登記，畢竟須與其他共有人協同為之（土地登記規則第25條），而所指土地其餘共有人均已死亡，所以在辦理分割以前，先須請求各該繼承人辦理繼承登記。

際耕作者，自應由承租人辦理繳售稻谷，出租人（地主）不得重複辦理。（糧食局）

泥鰍池水透明 易生青苔

問 (1)在貴刊36卷12期農業信箱看到，泥鰍不可與石螺同養，請問可否與田螺同養？

(2)泥鰍池裏繁殖了很多福壽螺（金寶螺），請問要如何防治？

(3)泥鰍池中為什麼會長青苔？（斗六市文化路635號廖淑珍）

答 (1)泥鰍池不可混養田螺。

(2)泥鰍池如發現有福壽螺，須檢拾螺體，摘除卵塊，加以銷毀或壓碎，在注排水口加細網阻隔，防止螺體流入。

(3)泥鰍池由於透明度太高，陽光可照射至池底，所以會長青苔。保持池水透明度30公分，可防止長青苔。（竹北水產試驗分所）

防止鴨子蝕毛 從改善環境著手

問 鴨子如果腹下毛換新，遇雨爛掉，有何藥物可治療？（高雄縣路竹鄉永華路80號楊曉得）

答 一般鴨子在5～6周齡時，如羽毛生長不良，就會引起往後蝕毛的現象，主要原因由於營養

分的平衡與飼養環境有關。

飼料應參照營養標準需要給與，過量或缺少飼料蛋白質與能量，對生長無益，羽毛也生長不佳，所以渴望養分的均衡與適量，尤其是蛋白質與代謝能比，要求適當比例，此外鈣、磷，或其他礦物質，也不能缺乏。

飼養密度，影響飼養場地的污染或羽毛生長。所以保持適當飼養密度，場地的乾燥清潔，有原子池可做洗浴羽毛是很重要。

蝕毛尚未有藥物治療方法，只檢討其洗浴池水或飼料問題，做適當的改進。尤其在5～6周齡時，正是主翼羽滋長的時期，容易引起羽毛生長不齊。下兩季，改進場地的排水、填鋪砂石或做棧架，以免泥濘而形成蝕毛的原因（潘金木）

