

可採摘，且採摘宜輕不可貪採，至冬季時則離地面50~70公分處自行水平剪枝，對於軟弱暗枝及強壯主枝也須加以處理，方法同前。

至第4年起，可行正常之採摘，而第4年冬季之剪枝工作必須加以調整，因此時茶樹樹型已定，剪枝方法改為孤型剪，使茶樹樹冠面成爲孤型，以利成木後之採摘作業。

茶樹幼木期之管理工作採摘與剪定工作非常重要，茶樹樹型之形成，樹勢強壯與否，皆與此有關，如不依此方法作業，不良的摘心採摘剪定皆將導致樹勢不良，植株矮小，甚至於容易衰老以至於死亡，實宜加以注意。目前本省各地區茶農往往爲貪求眼前利益，於定植後第1年或第2年起，即開始採摘，以至茶樹生機受損，樹勢不佳，實非其他原因造成，乃就是不當之採摘所致，應加以改正。

幼木施肥

定植後3個月行第1次中耕除草，逢下雨後土壤濕潤時，宜隨即開始施肥，但所施濃度宜低，至於其施肥量，可參考下表斟酌施用（公斤/公頃）：

樹齡	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
氮素	20~30	40~60	80~120	120~180	160~240
磷鉀	10~20	20~40	30~50	30~50	30~60
氧化鉀	15~20	30~40	40~50	40~60	40~70

補植

茶樹定植後，缺株絕難避免，缺率視栽植良否而異，因此補植工作非常重要。補植時期一般均在第2年立春前20天左右辦理，補植期最好能選下雨天或雨後土壤濕潤時實施，乾旱或炎陽高照時，最好不補植，但如天候影響，爲應農期需要，必須適時補植時，宜將補植穴充分灌水後再實施補植，補植的茶苗，在摘心或剪去末梢枝條後，再以樹枝葉遮蔭，以增進補植效果，避免因氣候乾燥或炎熱而影響茶苗成活。

補植所用茶苗，最好爲1年茶苗，如是隔年生茶苗，在補植前，其莖、葉、根系均須善加修剪以利補植。補植後須加以特別管理，除了應敷蓋遮蔭、澆水以防乾旱外，除草中耕時，切忌動搖茶樹根部，影響

購買棉子粕20包以上者，可獲贈品，請向經銷商領取，或逕向本公司連絡。

信用的標誌

純天然
(未脫棉一保證品質)
棉子粕
六和製有機質肥料



各種產品詳細資料
歡迎洽索。

蓖麻粕

印度原裝進口·有機肥料

含有成分：
氮 4.5-5.5% 鉀 1.5-2.0%
磷 2.5-3.0% 有機物 87%

適用作物：
各種果樹、
蔬菜、豆類
花卉

含有成分：
氮 5.5-6.5% 鉀 1.2%
磷 2.8% 有機物 82%

徵大專業務推廣人員

農 | 業 | 化 | 學 | 品 | 及 | 資 | 材

- 蓖麻粕(Castor Meal) 印度原裝進口，最優良之有機肥料。
- 海藻精(海中肥®Seaweed Powder) 西德進口，最好的葉面施肥劑，效果最快。
- 優肥®(Micro nutrient) 綜合有機微量元素，補充各種微量元素。
- 各種植物生長調節素 L-TYROSIN、 α -NAA、SNA、 α -NA、IAA、IBA、動激素、6-BA、調節植物生長、催花、催果、早豐收、促進分化、防止落果。
- 其他各種農業化學品 西德進口鉬酸鈉、磷酸-鉀、磷酸-鈣、日本進口鉬酸銨、美國進口硫酸錳、法國進口之E.D.T.A、鋅鹽、錳鹽、荷蘭進口E.D.T.A、鐵鹽及鈉鹽。
- 各種農業噴嘴 各型各式，不同作物之噴管、噴嘴。

六和化工股份有限公司 台北市中山北路三段47號7樓 TEL: (02) 5954321 (30線) 轉農業部