

確實避孕

可免人工流產

優生保健法於民國74年元旦公布實施後，一年來宣導教育給我們最大的感想是，一般婦女朋友們有一錯誤觀念，認為避孕太麻煩，因而採用低效率的避孕方式來配合婚姻生活，結果失敗率高，即尋求人工流產。

根據中華民國婦產科醫學會於民國73年12月下旬的一項調查顯示，接受人工流產的婦女有82%為有偶婦女，72%於私人診所接受此項手術。另外，有61%以上的個案已有過3次或3次以上的懷孕經驗。


那麼中止此次懷孕的理由以「不想再有小孩」，「延長生育間隔」、「婚前懷孕」居多。本次懷孕發生的原因以未採取避孕方法居多



二個女兒感情好(阿丰攝)

甜
度

提
高



落
果

防
止

果樹牌

適用作物：梨、蓮霧、芭拉、楊桃、蘋果、水蜜桃、芒果、釋迦、柑桔、荔枝、葡萄等。

竭誠徵求：
免費供試用，
核心推廣農友

鎂綠要素

是提供補充鎂元、鈣質及特殊微量要素之新奇鹼性土壤改良劑。

具有中和酸性土壤，促進作物葉綠素之構成，使作物對各種養分吸收力之增強，並可防止隔年結果。

備有說明書函索，歡迎來信、來電話詢問。

立晟化工廠有限公司榮譽出品

公司：台中市西區後龍街57-3號
☎ (04) 2229055 (公司) · 2792820 (工廠)

，佔61%。因避孕失敗而懷孕者佔37%。

在因避孕失敗而懷孕個案中，以採子宮內避孕器、月經週期法和保險套者居多。且做本次人工流產後，將採用的避孕方法，以子宮內避孕器者最多，口服避孕藥次之，而願意使用結紮、保險套、基礎體溫等者較少。

因此以上的研究結果，導致該次懷孕以未採取避孕措施為主要原因。可見，有如此多的婦女朋友並未重視避孕措施，却在性行為發生後懷了孕，才急着尋求解決途徑——人工流產。這對當事人而言，實在是極不明智的。

如果在性行為之前，即能採取適當的避孕措施，如男士用保險套、結紮，女士用口服藥、子宮內避孕器、結紮。或者在性行為後72小時內，女士及時服下2粒口服藥，間隔12小時再服2粒口服藥，停用後3天內，月經會出現，那麼也可達到事後緊急彌補措施。或者性交後72小時內或5天中，趕緊到衛生單位裝置帶銅絲的子宮內避孕器，

也可達緊急補救避孕措施，豈不是可以避免遭受人工流產這樣的身心創傷？

然而，從另一角度來看，在該調查中，除了沒採取避孕措施者外，因避孕失敗而導致懷孕者竟也佔37%。以如此高比例而言，似乎即使實施避孕方法，發生意外懷孕的機會仍不算太低，因此使用避孕器材時，未確實依照正確方法使用有密切關係。

比方說：未按時服用口服藥，過去曾有婦女朋友，用此方法來達到避孕目的，因服用時間不足，或忘記服用超過24小時以上，結果導致懷孕，又不想保留胎兒，只有實行人工流產，解決中止懷孕目的。

另外男士用保險套之前，忘了捏扁前端乳突部份排氣，結果性交導致破損，精液溢入陰道內意外懷孕，或性交後沒有及時撤離陰道，軟下來精液同樣溢出，導致懷孕等失誤，也是造成人工流產的主因。

為了這些失誤出現，宣導教育各種避孕器材的正確避孕方法應加強，民眾也應對正確避孕方法加以

注意且切實實行，減少意外，進而促使全民確實執行做到計畫生育之目的。

人工流產雖是一項婦產科的小手術，但手術後仍可能有合併症及後遺症。如細菌感染導致敗血症、出血、子宮穿孔、子宮頸裂傷、麻醉副作用導致生命危險，血栓或栓塞，胎盤或胎兒之殘留。同時，在長遠的心理方面也會有不妥、後悔與犯罪感，因此有的婦女以後會有性交不悅，及月經之情緒不穩定等後遺症。

在身體方面會有月經不規則、不孕、下次懷孕時可能流產或早產、子宮破裂、血型中RH原因產生自體免疫、子宮外孕、子宮頸閉鎖不全、子宮內膜異位等疾病。

因此對接受人工流產婦女來說，本身須承受極大身心衝擊。為了自己健康、家庭幸福，及整個國家人口政策、優生保健法，期盼婦女朋友們為了避免懷有非期望子女出現，在性行為前即應理智而有充分可靠的避孕措施，以避免事後求助於人工流產解決。



原裝進口 歷史悠久

最純正
蓖麻籽粕

含有成分：
氮 6%
磷 2%
鉀 1%
有機物 91%

新包裝上市

土壤改良 最佳有機質肥料

泰國蓖麻油工業公司(直接販售)

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社

服務處：(02)7044259 泰坦企業公司

(052)541017 林木榮 (045)874571 農友行

(036)663659 張金海 (089)322767 陳啓明 (036)882128來興公司

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、番石榴、蘆筍、枇杷、榛果、荔枝、蓮霧、茶樹、蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、甘蔗、蘿藦、花卉。