

含銅子宮內避孕器 滑入腹腔應即取出

• 心梅 •

含銅的子宮內避孕器在腹腔內異位後，有可能引起侵蝕性的危險。

這些危險包括出血、子宮穿孔、粘連及腸阻塞等，但不帶銅的樂普避孕器則沒有相同反應。

根據統計，在每千次裝置子宮內避孕器中，就有1~3次會造成腹腔內異位。但是醫界對於這一類合併症，是否需要剖腹取出腹腔內的避孕器，並沒有一致的結論。

為了解不同的避孕器留置腹腔後的反應，台大婦產科以狗進行了一項動物實驗。實驗的材料包括銅T、銅7、母體樂和樂普4種避孕器。每隻狗以手術方法分別將不含銅的樂普和3種含銅避孕器中的任一種，放入腹腔，然後依1個月、2個月、3個月等不同時間，觀察其在腹中引起的反應。

結果顯示，不含銅的樂普留置在腹腔內後，在任一隻實驗狗和任何時間內，都沒有引起病變和粘連。但母體樂銅7和銅T則都有粘連、發炎現象。病理切片結果，甚至引起組織嵌陷，結締組織增生。

這些併發症的嚴重程度和留在腹腔內的時間成正比。

這個實驗顯示，含銅避孕器在腹腔內的確有明顯的腹膜反應，有導致穿孔及腸阻塞的顧慮。

醫師認為，今後一旦發生避孕器腹腔異位，必須立刻取出，不應再等待有症狀反應後才設法補救。



健康活潑的下一代(張瑞卿攝)

婦產科醫師強調，子宮內避孕器雖然在生育計畫中發揮很大的功效，但是裝置避孕器的技巧和消毒、安全，仍不可掉以輕心。



請認明

三要素
最均勻
有機質肥料

含有成分：
氮 4.5-5.5%
磷 2.5-3.0%
鉀 1.5-2.0%
有機物 87%

純  正

脫棉壓榨

棉子粕

頂新製油實業股份有限公司

榮譽出品

彰化縣永靖鄉永靖街60號

(048) 221166(代表)

台北電話(02)5613909·5813907

改良土壤
肥効長久

適應作物：

蘋果、梨、葡萄、柑桔、
菸草、茶葉、枇杷、蘆筍、
番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、
甘蔗、番茄、蔬菜、豆類、
花卉、盆栽。