



田間觀摩栽插情形

七・中耕除草及鋪草

宜注意斟酌進行。因其鬚根接近地面，如鋤動恐影响生育及產量，或可免除此項作業項目（對長薯條型而言）。並在第2次追肥後，畦面加鋪第2次草。

八・繁殖法

山藥之繁殖，一為薯根，一為零餘子。零餘子形小，直接播種，繁殖率較高，但須2年後才能長大採收。若用薯根繁殖（長約30公分）一年即可收穫，但繁殖率不高，瑞芳地區農友却樂於採用此法繁殖。

病虫害防治

山藥無嚴重之病虫害，但氮肥施用過多，排水不良時，易引起炭疽病，可在發病初期噴洒65%鋅乃浦可濕性粉劑400倍液防治。虫害以夜盜虫、金龜子、紅蜘蛛等，但尚屬輕微，無碍山藥之生長。

六・立支架

可提高產量及減少病虫害發生。在抽蔓後插立支架，引蔓向上。材料以當地盛產之桂竹（直徑約2公分）為主，桂竹節間之枝條不須去除，蔓以放鬆為宜，以免因風吹而拉斷。

採收

山藥生育期約7~8個月，中秋節後蔓乾枯、葉片脫落即可採收。長薯條型山藥因深入土中1公尺左右，採收相當困難，須有純熟技術者方可收事半功倍之效，否則薯條會有折斷、脫皮、破損等現象，嚴重影响外觀，對品質及市場售價影响很大。



給您一個良心的建議！

提高產量

增加利潤

改良土壤

菜子粕

加拿大進口純菜子粕、亞麻粕
保證成份：

氮 N	5.5以上
磷酐 P ₂ O ₅	2.73以上
氧化鉀 K ₂ O	1.21以上
水份	12以下
夾雜物	2以下
有機物	85%以上

適應作物：

蘋果、梨、葡萄、柑桔、菸草、茶葉、
枇杷、番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、
甘蔗、蕃茄、蔬菜、花卉、盆栽、薑筍、
荔枝、芒果、釋迦、楊桃、水蜜桃



重光油脂股份有限公司

地址：彰化縣芳苑鄉和平村芳漢路王功段337號 TEL: (048) 932123~4 • 932322~3