



龍蝦養殖 還停留在儲養階段

問 (1)體形約1~1.5公分長的龍蝦幼苗攝食何種餌料？

(2)氣溫幾度以下會停止攝食或凍死，能否耐過北部的冬季？

(3)有無養殖龍蝦方面的專書？(台北縣淡水鎮埤島里11~4號張壬水)

答 (1)體形約1~1.5公分長的龍蝦幼苗，以豐年蝦、腕腳類以及幼蝦(切碎)為優良食物，草蝦飼料偶而也可飼養。

(2)氣溫能影响水溫時，20°C以下不攝餌，16°C以下時易凍死。一般而言，可以耐過在室內的冬季水溫，室外就不保險。

(3)沒有養龍蝦的書，因為目前繁養殖龍蝦的人很少。龍蝦的稚魚期須要6個月，才能變成小龍蝦，無利可圖。而且小龍蝦的成長又慢，所以少有人繁殖。一般都以儲養為主，即夏天價格較低時買了儲養，至冬天價格好時再賣出。(宋薰華)



龍蝦

低溫期蝌蚪池 北面應設遮棚

問 (1)2月間蝌蚪孵化後，常會大量死亡，會不會是地下水氧氣不夠，還是太冷太熱的關係？水溫幾度為適？

(2)我使用的水都是地下水，稻田灌溉的水，能不能給剛孵化蝌蚪使用？注入水須否消毒？

(3)場地要重新清溝，先消毒或先清溝後消毒？消毒藥品要到那裏買？

(4)田蛙皮膚病如何防治？(桃園市五山街233巷15號李慶信)

答 (1)蝌蚪雖然適應溫差廣，但最適水溫在24~27°C，3月以前產卵孵化的幼蝌蚪，氣溫仍然很低，尤其夜晚氣溫更低，常在15°C以下，剛孵化



養蛙場

的幼蝌蚪，不適應寒冷水溫，易使幼蝌蚪凍死。在這期間蝌蚪池的北面宜架設遮棚，防阻寒風，並注排水使池水循環，最好能加熱升高池水溫度，以適應幼蝌蚪生活。

(2)稻田灌溉的水，恐被農藥污染，不可使用。注入池內的水，不必消毒。

(3)養殖場地先用石灰消毒，然後清理水溝，水溝清理後，再用0.5%「福來頓10」噴霧消毒。藥品向專賣魚用藥品店洽購。

(4)發生皮膚病時，要經常更換池水，保持池水清潔。治療方法，在餌料中添加0.05/1000「四環素」，用0.5/1000「上野C20」或0.5/1000「富利魚」，1公升藥液每次浸洗20隻，約20分鐘，然後放入無池水的蓄養池，待病癒後放回飼養池。(黃堯)

書面證據遭毀壞時



「物證」、「人證」亦可為憑

台北縣汐止鎮康寧街 125號林王貴先生問：

我父親在世時，曾買 1 塊土地，登記我大哥名義，當時有一書面載明：我大哥應分給我。實際上，我父親生前亦已給我們分好。我大哥似存心私吞此一土地，父親所遺書面，既遭全部焚毀，不留證據。我大哥數年前又已過世，土地經我侄兒繼承。我要求侄兒應將其中 1/2 移轉登記給我，被他拒絕。我侄兒反有意控告我侵占此土地。請問有何良策保障我應有的權利？

高瑞錚律師答覆：

基本上，本案仍是證據上的問題。你如能舉證證明來函所主張的事實，你不但可立於不敗之地，無被指控侵占或竊占之虞，甚且，進而請求回復你應有的權利。反之，你侄兒將能請求你「返還」所指土地。

法律上證據方法，不限於「書證」一種。「物證」、「人證」等亦得為證據方法。你必須證明你父親當初真意所在。如不能證明，則只有寄望你侄兒「同意」，始能取得 1/2 的產權。

義大利黑麥草 本省中北部可種植

問 (1)義大利黑麥草可否在本地(新竹寶山鄉)栽種？種子何處有售？

(2)除狼尾草、盤固拉草外，還有何種多年生牧草，適合栽種作青割及乾草餵羊用？(新竹縣竹東鎮東林路49號 2 號楊榮億)

答 (1)義大利黑麥草屬溫帶型牧草，在本省中北部及高冷地區均可栽培，新竹寶山地區當然也可種植。種子可向農林廳種苗改良繁殖場(台中縣新社鄉大南村興中街 46號，電話(045) 811311)洽購。

(2)除狼尾草及盤固草外，適於本省栽培的多年生牧草尚有天竺草及南非鵝草，可供青割作青飼用或作乾草，天竺草較適於山坡地生長，而南非鵝草較適於低濕地區生長。(許福星)

李樹利用藥劑除葉 亦有催芽效果

問 (1)李樹未及除葉處理前，即遭受颱風災害，葉片全部脫落，並已萌發新梢及少許花朵，如此情形應避免再行藥劑處理落葉，而傷及新梢及花朵。有無其他補救方法，促進提高開花率及着果率？

(2)中生品種的李樹，葉片雖被颱風吹襲脫落，但尚未開花而僅萌發新梢部分，可否實施藥劑處理落葉，如予藥劑處理落葉當會傷及新梢，對樹體及開花着果有無影響？

(3)使用藥劑處理落葉，較人工摘葉，對促進提高

開花與着果率有無幫助？

(4)受風災李園如何經營，以促進提前開花整齊，達到產期調節之目的？(花蓮市中正路96號洪天生)

答 (1)可將枝條就近送到花蓮農業改良場，請該場人員代為檢驗芽體，是否已大部分皆已分化完成「花」；其方法為將芽體在放大鏡下把鱗片剝除後，檢驗是否有完整的「花朵」，如大部分芽體都活，則可用藥劑處理催花，否則不應再處理，留到明年讓它自然開花。

(2)若用藥劑處理，會影響已開的花，而導致落花，同時如果花芽尚未發育完成，可能只長葉，而不開花。

(3)以藥劑處理除可促其除葉外，另有催芽的效果，若用手除時，則無催芽效果，但有部分的芽亦能自然萌發。

(4)受風災的李園，若葉片受損嚴重時，應加施肥料，促使新芽萌發，不影響翌年產量，但若欲進行產期調節，則較有困難。(廖萬正)



紅肉李 (阿郎攝)