

土雞 飼養管理

籠飼對雞隻體重、雞冠面積與飼料效率的影響

歐美國家在近10年來不斷研究以籠子來飼養白肉雞，為的是要節省人工、設備及醫藥成本，但是仍有胸泡等問題無法解決。而土雞却能適應籠飼環境，不但無胸泡問題，而且避免打鬥問題，在體重、雞冠及飼料效率方面，也顯現有更好生產成績的趨向，如圖表所列。不過在企業生產上，以及羽毛外觀上仍需進一步的研究。

土雞籠飼的肉質好嗎？

土雞以籠飼方式飼養，由於環境限制了土雞的運動，對其肉質是否會有不良的影響？目前雖尚未有明確的結論，證明籠飼與平飼之差別，但並不意味二者無差別。若以國外一般雞肉官能品評方式來比較各種因素，不但不能察覺環境的差別，甚至於在比較雞種方面，土雞肉質分數偏高，但在統計上仍無法證明土雞肉顯着的比其他雞種的肉好吃。可見在檢定雞肉品質方面，仍需研究出較精確客觀的方法。

飼料供給量的調整

與白肉雞比較起來，土雞較能適應低營養濃度的

性 狀		性 別	平 飼	籠 飼
體 重 (公 克)	白肉雞 8 周齡	公	2,332	1,964
		母	1,897	1,747
	仿土雞 14 周齡	公	2,757	2,750
		母	2,048	2,120
土雞 14 周齡	公	1,773	1,910	
	母	1,364	1,404	
雞 冠 面 積 (平 方 公 分)	仿土雞 14 周齡	公	30.3	33.8
		母	7.4	7.0
	土 雞 14 周齡	公	37.0	46.3
		母	7.2	8.1
飼 料 效 率	白肉雞 0—8 周齡		2.31	2.41
	仿土雞 0—14 周齡		3.18	3.09
	土雞 0—14 周齡		3.25	3.28

註：本表摘自李淵百與黃輝煌（1985中畜會誌15（1—2）：1）



給您一個良心的建議！

提高產量

增加利潤

改良土壤

菜 子 粕

加拿大進口純菜子粕、亞麻粕
保證成份：

適應作物：

蘋果、梨、葡萄、柑桔、菸草、茶葉、
枇杷、番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、
甘蔗、蕃茄、蔬菜、花卉、盆栽、蘆筍、
荔枝、芒果、釋迦、楊桃、水蜜桃

氮 (N)	5.5以上
磷鈣 (P ₂ O ₅)	2.73以上
氧化鉀 (K ₂ O)	1.21以上
水份	12以下
夾雜物	2以下
有機物	85%以上



重光油脂股份有限公司

地址：彰化縣芳苑鄉和平村芳漢路王功段337號 TEL:(048)932123~4 • 932322~3