

柑桔銹蟬 多種藥劑可防治

問 我種植一大片文旦柚及柳丁，如防治不良，易患「黑柑」，即受銹蟬的傷害。過去大都以「克氯苯」防治，尚感方便，但最近不易買到「克氯苯」。請問：

(1)文旦柚及柳丁的銹蟬防治法，有無可代替「克氯苯」的藥劑？

(2)據說「錫蟻丹」效果好，但不適用於幼果期，且不可經常使用，是否如此？幼果期應如何認定？

(3)嘉義地區應於何時開始防治柑桔銹蟬？（嘉義市忠義街9號1樓曾崑烟）

答 (1)文旦柚及柳丁的銹蟬防治，可用①「錫蟻丹」2,000~3,000倍、②「大克蟻」1,000倍、③「得拉松」1,000倍（效果稍差）、④「鋅乃浦」800~1,000倍、⑤可濕性硫黃粉劑300~600倍。

可濕性硫黃粉劑，氣溫高時，使用600~800倍，晴天時效果好。噴藥後如下雨，容易流失。夏天時，千萬不要使用100~200倍，不然對樹勢會有不良影響。

(2)「錫蟻丹」也是1種可防治紅蜘蛛的藥劑，經常使用，容易引起紅蜘蛛的抗藥性。所謂不適用於「



柑桔 (阿郎攝)

幼果期」，可能是「容易發生藥害」的意思。


普通幼果期是指謝花後1個月~2個月內。注意不要發生藥害，須使藥液容易乾燥，即陰天或傍晚不要噴藥。

(3)嘉義地區防治銹蟬的期間，應該是4月下旬~10月，如果春季高溫早來到，須要提早施藥。（蔡雲鵬）

種子消毒·苗期灌藥 可防治甜瓜根頭腐爛

問 (1)6月間所種美濃瓜，在剛種2星期之內，有少數會從根頭爛。到了成熟之後，中午至下午瓜葉就會枯，到了晚上及清晨它就恢復起來。請問這是什麼原因？

(2)我在3塊地種植，1塊砂質地種起來瓜葉較美，瓜果也較大，另2塊黏壤土地，瓜葉較差，須肥也



洋香瓜 (阿郎攝)

較多。這是什麼原因？（雲林縣崙背鄉水尾村下街42號鍾慶孝）

答 (1)美濃瓜在種植2星期內根頭腐爛，原因可能為立枯病或疫病發生，應注意種子消毒，苗期可用「普尅菌」等藥劑灌注根頭部預防。

成熟株午後開始枯萎，晚上及清晨又恢復起來，可能為①水分失調，嚴重時甚至葉柄也較垂，着果過多，也會發生此現象。②蔓割病或蔓枯病為害。

(2)砂質地生長較快，但着果後提早衰老。黏壤土初期發育較慢，但植株壽命長，對着果後生長較有利。（黃賢良）

七星鱸魚 可與吳郭魚混養

問 我家現有0.2公頃的池塘，想要養殖鱸魚。請問：


購買土地應即登記

高雄縣桃源鄉建山村83-1號高文良先生問：

我祖父於民國41年向附近平地人購買土地，由我經營迄已30餘年之久。當初，雖立有簡單契約書，但時日已久，賣主均已死亡，子子孫孫不知幾10人，要一一找出，談何容易。有的要求蓋一個章，給5,000元。如把錢給了，繼承人又不辦理，有何保障？

高瑞錚律師答覆：

來函所述情形，是一個「讓權利睡着了」的典型案。一般契約履行請求權的時效期間，為15年（民法第125條），權利人逾此時效期間不行使請求權，義務人即取得時效消滅抗辯權，據以拒絕契約的履行。



超過時效徒增困擾

你們沒有在15年的時效期間內，請求賣主或其繼承人辦理所有權移轉登記，是嚴重的疏忽。如今，時效已消滅，賣主的繼承人，可拒絕協同你們辦理過戶，而且時間愈久，子孫枝葉愈繁，繼承權人人數愈多，請求對象亦愈複雜。欲期謀求解決，須付出代價，必然相對增加很多。

本件土地，仍須由賣方的繼承人全體（不論人數多少）辦妥繼承登記，然後始有可能過戶與你們。所以，在賣方未辦理繼承登記以前，你不應付錢給對方。必須辦妥繼承之後，由繼承人全體或其代理人（均應加具授權書），與你重訂買賣契約書及其他過戶所需書件，而於正式送付地政事務所收件之同時，給付所約定價金，藉資保障。

(1) 鱸魚有幾種？各種養殖方法是否相同？利用河川灌溉用水可否養殖？

(2) 何時放養？魚苗何處有售？

(3) 集約養殖應注意那些事項？飼料如何調配？可以利用養吳郭魚的池塘養殖嗎？（苗栗縣頭份鎮山下里後湖19-1號黎煥樑）

答 (1) 本省養殖的鱸魚有3種：七星鱸、紅目鱸、美國鱸等，飼養方法大致相同，且可引用河川灌溉用水作為水源。

(2) 你的魚池位於中部以北，建議飼養七星鱸，一般在春夏季放養，請就近向「新竹縣竹北鄉新港村13-1號朱建德先生（電話035-552484）」洽購。

(3) 除須注意飼養管理外，如發現大小參差不齊時，宜加以分養，藉以提高成活率，使用人工粒狀飼料較自行調配經濟，可以與吳郭魚混養，藉收控制養殖密度之效。（余廷基）

木瓜間作蕉園 易徒長

問 (1) 現在木瓜較優良的品種為何種？種苗何處有售？

(2) 毒素病及白粉病有無較佳的農藥防治？

(3) 栽培木瓜，山坡地以上、中、下，何處為優？可否與香蕉間作？（台中縣霧峰鄉萬豐村象鼻路15號


黃農友）

答 (1) 本省過去推廣的木瓜優良品種有日陞、蘇魯1號、台農雜交1、2、3號。目前本省栽培最多的品種為台農雜交2號，種苗「鳳山市鳳松路園藝巷4號鳳山熱帶園藝試驗所」有售。

(2) 木瓜毒素病目前仍無藥可治。白粉病宜每隔7~10天噴12.27%「芬瑞莫」（穩達達）乳劑8,000~10,000倍、19.59%「白粉克」可濕性粉劑1,500倍或50%「免賴得」（萬力）可濕性粉劑1,500~2,000倍1次，連噴3次以上。

(3) 山坡地以「下」最好，「中」次之，「上」最差。

木瓜與香蕉間作（混栽）有利亦有弊，利點為可阻礙蚜虫媒介傳染毒素病，即木瓜間作於蕉園較不易得毒素病。缺點為日照通風不良，木瓜易徒長，結果部位高，產量較低。（王德男）



木瓜（沈安麗攝）