

紅鹿



鹿茸 產期調節

經挑選產茸期提早的紅鹿，所生產的鹿茸重達7.5台斤以上，長度達2.37m。

· 徐振良

傳統養鹿，大抵在春季長茸（春茸）如水鹿、紅鹿5～6月採割，或5～6月長茸（夏茸）如梅花鹿7～9月採割。

由於生產鹿茸的產期集中，市場需求較不熱絡，以至有潛在的市場壓力。針對此一問題，目前在育種及飼養管理上，除育成了麋鹿和紅鹿的一代交配種外，也做到了鹿茸的1年2收，更生產了高品質11月～翌年3月採割的冬茸，以達到最高的生產效益。

期較早，產量高的做為父系，3年來，牠的子代均具有提早產茸特性。

2.飼養方法的改進：改變傳統上割茸後，就不給精料的飼養方法，反而與產茸期般的給與充分營養和高量蛋白質精料，使鹿隻提早達到長茸的生理狀況，配合廣闊的放養空間及足量的浸水設施等環境改良，使鹿隻體溫降低，促進食慾，而育成冬茸的生產。

產期調節的方法

鹿茸的生成，是鹿隻長期養分累積及內分泌變化、睪丸萎縮（縮小約5倍，此時公鹿已不發情），體內營養及某些化合物達到一定濃度，加上環境低溫的刺激而達成長茸準備，對此，吾人提出若干改進方法如下：

1.挑選產茸期提早的鹿隻：鹿隻的提早產茸特性，有很強的顯性遺傳，我們在整批產鹿中，挑選產茸

生產冬茸的效益

冬茸因經過寒冬的洗禮，含氣充足，藥性強是鹿茸的上品，為消費者所鍾愛。但因產量少，客戶皆採預購方式，因此，也消除生產旺季的銷售壓力。同時依據採茸經驗，早期產冬茸的鹿隻，經過2～3個月休息、調養，在正常產茸期仍然會解角、長茸，多了一季冬茸的收成，也使產期前後達9個月之久。以三峽鹿園為例，鹿場的公鹿，75年12月已長茸的有15隻，佔全部公鹿的 $\frac{3}{4}$ ，其中已採割了3隻，達到了增加收益、活潑農場資金的目的，值得養鹿人士之參考。