

媳婦離家出走

• 小光

台灣地區推行家庭計畫「兩個孩子恰恰好，男孩女孩一樣好」口號以後，已有十數年的歷史。但在各地農村，還是有重男輕女的落伍觀念存在。

筆者有一位住在高雄縣梓官鄉的親友告訴我一件真實的事，使我感觸很深，特別轉告給大家，可作為參考。事件的主角是一位33歲的王姓婦人，她一連生下4個女孩，因為婆婆重男輕女，在萬念俱灰之下，離家出走。

這位王姓婦人結婚迄今已滿10年，均未生育男孩，最近又產下1女孩。由於王婦已經連生4個女孩，婆婆抱男孫心切，她自怨肚子不爭氣，心情苦悶之下，利用家人不在家時，背着才出世不久的么女出走，音訊杳然。

王婦的丈夫發現妻子離家出走後，除了到岳家，並到處尋找，都未見其母女踪影。王婦的婆婆自媳婦離家出走後，見她的兒子無心工作，十分後悔，拜託各報記者刊載協助尋找她的媳婦，希望她早日返家團聚。



玩得真快樂(徐光宇攝)

益米靈® Imidan®

50-WP

經政府正式登記之適用作物範圍：

益米靈為一種低毒，高效有機磷殺虫、殺蟎劑。適用範圍廣泛，包括水稻、果樹(柑桔)、蔬菜(葱、韭菜)等作物，對人畜十分安全，對作物無藥害，且對一般害虫之天敵無害。問世以來，在亞洲、美洲、歐洲、澳洲等極為暢銷。

作物名稱	防治害蟲	每公頃每次使用量	稀釋倍數	注意事項
水稻	一點螟蟲 二化螟蟲	0.8~1.2公斤 (秧田至孕穗期) 1.2公斤 (孕穗至齊穗期)	1,000	收穫前三週停止使用
	縱捲葉蟲、稻苞蟲 稻飛虱、鐵甲蟲、台灣夜盜蟲、稻刺馬		1,000	收穫前三週停止使用
	負泥蟲	0.8~1.0公斤	1,000	水稻分蘗期中，負泥蟲幼蟲發生時開始噴藥，若施藥後，田間密度尚高，隔15天再施藥一次
葱	潛蠅	0.5~1公斤	1,000	1.噴藥時加展著劑 2.採收前七天停止使用
韭菜	潛蠅	0.5~1公斤	1,000	3.開始發生時7天施藥一次
柑桔	潛葉蛾	1.6~5公斤	500	1.只噴射新芽部份 2.用藥量依樹齡大小酌量使用 3.於新芽萌發時，每七天施藥一次



® 台灣總代理：國際技術社股份有限公司

® 係註冊商標

國外製造廠：美國 STAUFFER CHEMICAL COMPANY U.S.A.

台灣總經銷：大勝化學工業股份有限公司 電話：(02) 562-8971-5