




一條根 以種子繁殖

問 中藥一條根繁殖方法為何？何時可採收？本省何處種植最多？（高雄縣甲仙鄉小林村忠義路130號蔡松林）

答 「一條根」又名細葉千斤拔、犬狐狸豆、千斤拔、老鼠尾、透地龍、牛大力、千里馬。屬豆科學名 *Moginania lineata*，一般以種子繁殖，2～5月為播種適期，首先應整地作畦，行株距60×30公分，栽培管理簡便。多以冬季或下雨後採收為宜，因屬直根性，長達60公分，於雨後拔起為宜。

目前在新竹、高雄原野自生，本省所需一條根的藥材多採自野生。（徐原田）

台農67及68號甘薯 適於養牛

問 我有近甲的田地，想種甘薯餵肉牛，請問何種品種產量高？何處可購得種苗？（雲林縣二崙



（林吉郎攝）

鄉庄西村洲仔67號顏順隆）

答 (1)如為採收甘薯塊根作為飼料，可種植台農67號。台農67號是澱粉消化性優良的飼料品種，秋作生育期150天，每公頃塊根收量為44.3公噸。塊根乾物率為30.6～37.1%。

(2)如為採收莖葉作為飼料，可種植台農68號，因其莖葉生長茂盛，葉面積大，生長力強。

(3)種薯可向「嘉義農試分所」申購。（李良）

塑膠布網室種菜 防雨防虫效果好

問 (1)結球萵苣有無外銷？外銷品種為何？外銷時間及經辦單位？如何連絡？

(2)西洋芹菜國內市場如何？以綠骨或白骨為主？

(3)網室栽培與塑膠室栽培，何者為優？（彰化縣田尾鄉三溪路20號陳敏楠）



（沈安麗攝）

答 (1)結球萵苣有外銷，時間是12月～次年4月。本省夏季太熱，無法種植，反向美、日兩國進口。外銷地點是日、韓、香港及東南亞等地。外銷是綠黃色品種。有關外銷事項，請向「高雄縣路竹鄉環球路201號路竹蔬菜運銷合作社電話：(06) 5862074王周文經理」接洽。

(2)西洋芹菜就是美國芹菜，國內市場銷路不多，以台北市場而言，每日3,000公斤就夠，冬季本省已大量栽培，銷售不完，夏季也向美、日進口。以黃白色葉梗品種為主，綠色次之。（吳昭其）

(3)網室栽培，若全部使用塑膠網，可能在初期使用時，可減少昆蟲進入，雨水仍舊會進入，很快會使內部濕度提高，同時溫度又高時，容易引起病害發生

土地交換使用

高雄縣美濃鎮龍山里中華路3號詹文達先生問：

我的一筆建地，部分面積於日據時期由祖父與某甲的林地之一部，交換使用。建地供對方做道路使用，對方林地交祖父種植林木。當時未立契約書，亦未相互割讓與對方。

日前，我種植竹筴，竟遭對方砍伐，意圖收回該林地。請問我是否有權收回上述道路用地？

高瑞鈺律師答覆：

，所以我們不提倡使用網室。

目前使用塑膠布網，以鍍鋅搭架，並使用現成的鐵絲夾、塑膠夾，很容易施工，自己可以搭建。此種網室，屋頂上蓋塑膠布，側面蓋32目或24目塑膠網，所以可以防雨、防虫，效果較好，台北近郊有許多地區已推廣如板橋、新莊、蘆州、汐止、瑞芳都有搭建，栽培效果亦好，可前往參觀，或到「桃園區農改場三重分場」看。（張榮如）

柑桔花薊馬 開花及幼果期爲害

問 (1)柳橙果實上有一般人所謂的「風疤」，應如何防治？

(2)柳橙果實爲何蒂頭凹陷無汁，如何防治？（台南縣白河鎮嶺內里頭前溪16~1號張榮山）

答 (1)柳橙果實上所謂「風疤」是柑桔花薊馬，多於開花期及幼果期爲害。花薊馬的數量與冬季低溫期及雨水有關，如冬天寒流較多，低溫期長，且又常下雨，則春天開花後，花薊馬數量少，可不必施藥。如冬季暖及乾燥，開花期花薊馬數量多，可施用「大禧」乳劑1,000倍防治，應在盛花時噴施。

(2)柳橙果實接近果蒂部果肉無汁，主要原因爲：
①樹勢營養生長太旺盛，葉片大，徒長枝多，葉片搶水分較果實爲強。
②土壤中氮肥效果高，所以應減少土壤中氮肥，肥料應降低氮素比例。

另一方面追肥應早施，不可在7月後仍施用追肥，可減輕此現象。果實不可晚採，無汁情況才能改善。（呂明雄）

法律問題

宜有適當證明

你若能證明當初確有交換的協議，則對方既無權砍伐你種植的竹筴，亦無權要求收回林地。你仍能繼續耕作林地，並排除對方的干涉。

但是，你如果不能證明有此協議存在，對方亦不承認有交換之事者，你當然得以無權占有爲理由，請求對方將你名義的道路用地返還（民法第767條）。

餵水餵母豬 易生營養不良小豬

問 (1)近半年來，母豬常生出後肢不能站立的乳豬，並不像狂犬病那樣整隻乳豬會抖，只是後肢不能站立，我是以餵水餵母豬，只有在哺乳期才餵飼料。是否母豬缺乏養分所致？如何防治？

(2)母豬產後發情，但陰部都會流出白色粘液，並非正常發情排卵的白色液體，屢次配種均不受胎，如果是子宮發炎，要如何治療？用盤尼西林清洗子宮是否有效？（嘉義縣朴子鎮天星新村82號林明松）

答 (1)很可能是如你所推論，母豬在懷孕期間，胎兒無法自母體攝取充分而平衡的營養所致。所以可試在母豬懷孕期，改飼平衡飼料。

(2)有可能是生產時或產後併發細菌感染。母豬生產時，若有難產或助產，必需於產後灌洗子宮，可用高倍稀釋的碘劑或無刺激性消毒劑，再灌注抗生素，母豬還必需以廣效性抗生素連續注射3天。

此外，在其他期間所發生的子宮炎及子宮蓄膿，極難醫治，最好淘汰。（吳福明）

