

永久的避孕法

結紮

● 心梅 ●

女性結紮

女性結紮是將女子兩側輸卵管之中段部分結紮起來，使卵巢排出的卵和體外進入的精虫無法會合成受精卵，而達到避孕的效果，目前最常用的手術方法是腹部（即迷你結紮）、腹腔鏡和陰道式三種，根據台北市家計中心的調查統計顯示，以迷你結紮佔 62.46% 最多，腹腔鏡及陰道式結紮各佔 2.68 % 和 2.25%，接受結紮的平均年齡為 30 歲。

另一項有趣的統計資料是職業為務農、管理人員、生產、運輸操作、體力工和佐理人員者接受結紮的傾向較高；但買賣工作人員、專門技術人員、服務業人員及家庭主婦等則偏低，她們均有早婚傾向且生育力較高，其平均子女數為 3.1

人，且對子女性別有重男輕女觀念，而接受結紮之主要動機為已有足夠子女數（佔 90.85%）。

結紮輸卵管是一種小手術，剖腹生產時順便結紮輸卵管是最適宜時機。在產後結紮，由於開刀容易，傷口小，恢復快，很少發生合併症，就是平時無懷孕或流產手術後施行也一樣方便。手術時間約為 30 分鐘左右，稍事休息即可，但要避免繁重的工作。

如果有下列幾種情況者，則較不宜做結紮手術：

1. 開過刀者，尤其是下腹部，因輸卵管易和腸子沾粘在一起。
2. 不適宜開刀者、有嚴重內科疾病者，如糖尿病症、心臟病、慢性高血壓等，因危險性較大。
3. 心理不健全者，恐懼結紮後會有後遺症。



給他一個活動空間(阿丰攝)

4. 還想再生育者，雖然結紮後尚可恢復生育，但成功率只有 30~70%。

所以對於(一)婦女本身有嚴重遺傳病症，很可能會遺傳給下一代，使子女夭折或身心受巨大創傷者；(二)如果懷孕或生產會嚴重威脅到婦女的生命者；(三)40歲以下而有足夠

歡迎購閱 / IFPRI PUBLICATIONS

國際食品政策研究院 委託本社供應新書

International Food Policy Research Institute

- FOOD IN THE THIRD WORLD : PAST TRENDS AND PROJECTIONS TO 2 0 0 0 (76頁)
- REGIONAL COOPERATION TO IMPROVE FOOD SECURITY IN SOUTHERN AND EASTERN AFRICAN COUNTRIES (89頁)
- INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESERACH AND HUMAN NUTRITON..... (326頁)
- THE WORLD RICE MARKET: STRUCTURE, CONDUCT, AND PERFORMANCE (79頁)
- LIVESTOCK PRODUCTS IN THE THIRD WORLD: PAST TRENDS AND PROJECTIONS TO 19 9 0 AND 2 0 0 0 (87頁)
- DETERMINANTS OF AGRICULTURAL POLICIES IN THE UNITED STATES AND THE EUROPEAN COMMUNITY (80頁)

豐年社

每本定價240元，每次郵購另收掛號郵資16元

台北市溫州街14號 服務電話(02)3938148 郵政劃撥0005930-0豐年社