

剛要上升前，把它有效的控制下來，相信以後可以減少幾次的用藥。其他害虫如蚜虫、捲葉虫、葉蟬等如有發生，可配合其他病虫的防治一起施藥。

減少用藥種類和用量

(1)不任意混用農藥

防治1種病或虫，只需選用1種效果好的藥劑，若同時有2種以上的病和虫，才需要混合適宜的藥劑，絕沒必要混用性質相同的藥劑。噴藥的目的乃在保護番石榴，減少被害，不要沒有信心，或聽信農藥零售商任意推荐，施用不必要的藥劑。

若要混合2種防治對象相同的藥劑，不是不可以，但要以半量加半量的方式混合，如防治番石榴粉介壳虫，以40%「滅大松」乳劑1,600倍加50%「馬拉松」乳劑2,000倍的防治效果，比用40%「滅大松」乳劑800倍或用50%「馬拉松」乳劑1,000倍單劑有效，而「滅大松」半量加「馬拉松」半量的藥費，也比使用「滅大松」全量便宜。

(2)依照推薦量施用

1種藥劑在一定面積的用量有一限度，超過這一

限量是一種浪費，而且超量使用，也容易引起藥害。如「滅大松」對番石榴粉介壳虫及其他害虫都相當有效，但濃度太高或用藥次數太頻繁，會使葉片變黃褐而提早落葉，對果實也會造成藥斑。因此應依照推荐量使用，以免增加防治成本和引起不良後果。

注意安全採收期 採果期避免噴藥


農藥噴布於番石榴以後，在植株、葉片、果粒上的農藥將會殘留一段時間，至於到底殘留多久，這要看噴什麼藥、噴藥後的環境影响如何而定。有些藥噴了1、2天，即無殘毒或只剩微量（在容許量內），有些需經10~20天才能採收。

植物保護手册上所列番石榴粉介壳虫的推荐藥劑中，25%「谷速松」乳劑、50%「普硫松」乳劑、及50%「歐滅松」溶液的安全採收期都是21天，也就是說施用這些藥劑後，需等21天才可以採收食用，而另一藥劑40%「滅大松」乳劑的安全採收期為8天。其他病虫害迄今尚無推荐藥劑，若所用藥劑已推廣在其他果樹，應留意其安全採收期是幾天。

番石榴一進入採果期，幾乎每隔1~3天即採果

農作物栽培網

●省時省工●降低成本●提高產量●



- 適用於：
莖類、爬藤類、瓜果類、
蔬菜類
- 用途：
防風、防雨、防止倒伏、
不易發生蟲害、方便採收

- 主要產品：
花網 / 瓜網 / 芹菜網 / 蘭草網 / 豌豆網 /
香瓜梨網 / 萬年青網 / 甜椒網 / 蕃茄網 /
紅辣椒網 / 蔥網 / 大蒜網 / 蘆筍網 / 茄網
等各種農業用網
- 其他產品：漁網 / 運動網 / 安全護網

欣隆製網有限公司

工廠：彰化市華陽路174-1號
電話：(047)524625-524725