



大部份發生在老葉，嫩葉很少發生。

3.樹幹、枝條：主要在颱風過後或修剪後，有傷口時，病原菌即侵入傷口而感染，嚴重時有流膠現象發生。

防治方法：儘量不要使植株有傷口發生，發病時以下列藥劑輪流使用。

- ①波爾多液10~10式。
- ②鏈黴素液劑 1,000倍。
- ③大佳可濕性粉劑 500倍。
- ④錳乃浦（大生M-22）可濕性粉劑400倍。
- ⑤53%護粒丹混合可濕性粉劑 1,000倍，可加展着劑使用。

蚜虫：

羣集於新梢、花穗及果實上吸食養液，並分泌甜液，誘發煤病。會使芒果新梢捲縮，花穗及果實生長不良。

防治方法：

- ①50%達馬松溶液 1,000倍。
- ②85%加保利可濕性粉劑 800倍。
- ③90%納乃得可濕性粉劑 1,800倍。

粉介殼虫：

爲害芒果的介殼虫有多種，今年以粉介殼虫最嚴重，一般成虫及稚虫都密集於枝條或果實上，吸食汁液，誘發煤病，影响果實品質。

防治方法：

- ①40%滅大松乳劑 1,000倍。
- ②50%歐滅松乳劑 1,000倍。
- ③97%夏油乳劑 200倍。（限冬季使用）
- ④44%大滅松乳劑 1,000倍。

果實蠅：

俗稱「蜂仔」，於芒果果實成熟期爲害最烈，因果實成熟期正逢其發生密度最高期，成虫（雌）產卵於將成熟果皮內，卵孵化後，幼虫蛀食果肉爲害，使果實腐爛失去商品價值。

防治方法：

- ①33%福木松乳劑 650倍。
- ②50%芬殺松乳劑 1,000倍。
- ③懸掛誘殺器，內沾含毒甲基丁香油，誘殺雌性成虫。
- ④套袋：在5月進行套袋，防治效果最佳。

果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找 台和!!			
葉面施肥·亦可混合農藥使用	有機質 磷鉀肥 魚精 開花肥 0-10-10		促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳 花蕾肥碩、開花旺盛——着果良好 結實大 美國ALASKA魚肥公司 出品
	果樹·蔬菜用 花寶(HYPONeX)系列!!		
	花寶二號 20-20-20 促進果實肥大 糖度增加 美國The HYPONeX Co., Inc. 製造	花寶三號 10-30-20 促進開花 增加着果率 結實良好 美國The HYPONeX Co., Inc. 製造	
地面撒佈 使用方便	《最新奇 特殊土壤改良劑》 ——改善水果品質的秘方—— 促進着色 提早成熟 糖度增加 強健植物生理機能 增強貯藏力	鈣元® CALGEN カルゲン 日本製造 原裝進口供應	高單位鈣質 改善土壤 控制氮肥 防止徒長
各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯—— 台和園藝企業股份有限公司 Taiwan Horticultural Co., Ltd. 台北市士林區中正路104巷1弄2號 台中連絡處：台中市三民路一段164號			
		郵政劃撥：0101360-9 電話：(02) 831-3302 電話：(04) 2223374	