

小胡瓜 不適於連作

問 小胡瓜第1次栽種採收完畢，若不將棚架拆掉，而繼續沿用第2次，栽種新的瓜苗在原来的田地上，應如何管理，才可增加產量？（嘉義縣新港鄉潭大村大竹園24號周珍）

答 (1)小胡瓜連作，易發生胡瓜露菌病等病害，所以最好利用其竹架，栽培豇豆為宜。

(2)如你仍欲試着連作，請按下列步驟實施：

①先清除前作瓜蔓，搬離田間。然後向竹架噴射77.5%「嘉賜銅」可濕性粉劑1,000倍消毒。

②如前作採用銀色塑膠布覆蓋畦面，則將在前作的株距間，重新挖開栽植穴，並放入腐熟堆肥和清潔土（1：1比率混合（所混合的培養土若干，然後下種，以利苗株發育，等苗齡達到本葉2～3倍左右，灌注「阿特靈」1,500倍和養根素1,000倍混合液，藉以預防疫病的發生，及促進根部發育。

③宜採用早生品種例如鳳燕，提早生產，力求穩定為上策。

④定期施藥，預防露菌病、炭疽病等的發生。適



胡瓜採收（張俊惠攝）

宜整枝，以利通風，日光照射良好，使生育健全，果實發育順利。（王進生）

大蒜軟腐病 排水不良地易發生

問 (1)大蒜葉尖及下葉黃化為何原因？有無減少的方法？

(2)大蒜毒素病（萎縮病）發生了如何處理？會否傳染？

(3)植株生長情形欠佳者，連根拔起，可發現鱗莖長黴（青黴、黑黴）腐爛情形，且裏邊有虫在吃食。如何防止此種情形再發生？如何防治？

(4)大蒜覆蓋以何種材料為佳？覆蓋厚度如何？（花蓮縣大禹嶺關原路10號合歡山農場曾惠珠）

答 (1)大蒜葉尖及下葉黃化的原因為，(D)種蒜成熟度不夠或未曬乾。(2)遭遇高溫多濕。(3)日照不充足。(4)土壤酸性及病虫害（如黑斑病、軟腐病、薊



高冷地種蒜頭（張瑞卿攝）

馬、地下害虫）均會引起蒜葉黃化。

減少黃化的方法：①蒜種盡量選購充分曬乾、硬實、且無帶病的蒜種。②日照要充足，注意灌水及排水，以免太乾或太濕。③大蒜不適酸性土壤，因此土壤酸鹼度須注意校正。④針對病虫害種類對症下藥。

(2)感染毒素病後，很容易傳染其他植株，所以罹患毒素病的病株應及早拔除，同時對蚜虫及薊馬應徹底防治，以免傳染病毒。

(3)植株腐爛是軟腐病為害，高溫多濕或排水不良的土地，及栽植期間遇長期降雨，或灌水過多時容易發生。罹病株鱗莖呈水漬狀腐爛，且有臭味，下葉呈黃萎枯死。


防治方法：①不可連栽。②避免在低濕土地栽培，應作高畦並注意田間排水。③防治地下害虫，以防發生傷口傳染。④罹病時應減少灌水，使土壤乾燥，以抑制病勢的蔓延。

購買土地

雲林水林鄉大溝路74號李路先生問：
我在30年前，買1筆建地約200坪左右，但這筆土地，已列為祭祀公業，不能登記過戶。且本村農地重劃，這筆地在重劃範圍，亦無法過名，請問有何方法辦理登記？

高瑞錚律師答覆：

來函未詳細說明買賣經過情形，不知當初是向何人訂約買受。祭祀公業的土地，並非絕對不能買賣或過戶，如是由祭祀公業派下員全體同意或經組織規約或派下員大會授權管理人訂約者，買賣契約應為合法



儘快辦理過戶

成立生效，自得請求該祭祀公業管理人，履行移轉登記的義務。

所承購土地，未及辦理過戶，買受人亦得於土地重劃完成後，請求出賣人就重劃後，分配所得土地及補償金額，移轉與買受人。

本件問題所在，恐係訂約遠在30年前，已罹於民法第125條所定15年的時效期間。出賣人於時效消滅後，對於買受人的請求，得行使時效消滅抗辯權，以資對抗，所以，除非出賣人不行使此一抗辯權，仍願協同你辦理移轉登記手續，否則將無法過戶。

(4) 覆蓋材料一般以稻草為多，亦可利用塑膠布。覆蓋厚度以畦面一薄層，無法見到土壤為準，太厚不經濟，太薄無法得到覆蓋目的。覆蓋材料除稻草外，亦可利用乾枯的尖葉性雜草（不帶種子者）或枯樹葉亦可（如木麻黃枯葉）。（曾紹均）

台中190號稻種 具抗稻熱病特性

問 我想在二期作種植台中190號早熟品系水稻，請問台中190號有何特性？（雲林縣斗南鎮明昌里紅磞95號沈書輝）

答 ①特性為：早熟，第一期作112天，第二期作82天。②抗稻熱病。③中感紋枯病。④中感白葉枯病。⑤不抗褐飛蟲。（林再發）

防治柑桔薊馬 可用「大生」或「錳乃浦」

問 柑桔、柚子開花期，花薊馬及茶黃薊馬為害甚重，應如何防治？（南投市大同南街22號張清炎）

答 柑桔或柚子開花期會為害的薊馬有花薊馬及茶黃薊馬，跑進花苞內或吸食花瓣。

(1) 茶黃薊馬可能為害果皮，致成銀灰色，尤其在幼果期，以口器銼吸果蒂部，造成輪狀傷痕。

(2) 花薊馬資料尚缺，不敢確定是否會傷害果皮。

以上兩種可使用「鋅錳乃浦」（大生M-45）或「錳乃浦」500倍稀釋液，可有效防治。（邱輝宗）

文旦柚施肥 可用複合肥料

問 文旦柚應如何施肥？1年要施幾次肥？用何種肥料較適合？（宜蘭縣冬山鄉清溝村光明路168巷30號簡兩固）

答 (1) 文旦柚施肥，一般幼樹（未結果樹）1年施4~6次，即2~3個月1次，成樹（已結果樹）1年施3次為宜，即分春肥（2~3月）、夏肥（6~7月）和秋肥（11月）。

(2) 肥料種類，幼樹可用合肥5號或43號肥料，至於成樹的春肥和秋肥，可用合肥5號或43號肥料，夏肥為促進果色和提高糖度，可用合肥2號肥料。但是為維持地力，及增加土壤的有機質，每年冬春季，應加施有機質肥料，每株5~10公斤，例如堆肥、厩肥、粕類、牛糞、雞糞等，但是必須腐熟才可以深施。（藍調）



文旦展售(阿豐攝)