




柑桔追肥

1年4次


問 (1)76年元月種下柑桔、柚子、檸檬，2年生苗，現在可否施肥？施什麼肥？可否用雞糞？用量若干？未結果前，夏季可否施用「好年冬」，藥性持續多久？

(2)柑桔類種植距離6公尺×5公尺，已作水土保持，是否適合？

(3)柑桔園中可否間種辣椒，施何種肥料較適合？(台中市北屯區三光巷64弄43號詹益輝)

答 (1)若已成活可以施肥，追肥可用台肥5號，每年每株的施肥量為0.4公斤，分4次施用，即2、5、8、11月各1次。至於基肥可用雞糞，每株3公斤，但是必須發酵過，才能施入土中，假若未經過發酵，只能施在表面，以免發酵時，發熱燒死根系，或鹽分過高，阻碍根的生長，最好是用發酵過的堆肥或廐肥。

「好年冬」是1種殺蟲劑，在柑桔方面，可以用100倍噴施主幹防治星天牛，1,200倍噴施枝葉防治刺粉蝨、木蝨、蚜虫等害虫，但是藥性很毒，必須帶口



阿丰攝

罩、手套，以防藥液沾及皮膚或吸入體內發生中毒。

(2)種植距離，一般柚類為7.2×7.2公尺，甜橙為6.6×6.6公尺，桶柑、極柑為6×6公尺、檸檬5.4×5.4公尺。

(3)柑桔園在幼樹時期空間還很寬，可以間作辣椒，施肥量每公頃可用氮素100~150公斤，磷鉀150公斤，氧化鉀50~100公斤。(藍調)

夏季種玫瑰

Samantha與Red Success

問 何品種玫瑰夏季做切花，壽命較長？(花蓮縣吉安鄉福興村167號林春明)

答 目前本省現有玫瑰品種中，夏天切花壽命較長者有Samantha和Red Success(俗稱54瓣)。為了增加切花觀賞的時間，夏天採收切花的程度，比冬天採收切花的時期早，即在緊蕾期剪。(朱建鏞)



林果攝

泥鰍苗尾鰭腐爛

是粘液性細菌病

問 (1)泥鰍苗為何尾鰭會腐爛？如何防治？
(2)泥鰍苗為何全身發白？如何防治？

(3)泥鰍人工繁殖需用的藥物及工具為何？(台北縣林口鄉東林村自強七街26號2樓陳崑仁)

答 (1)泥鰍苗尾鰭腐爛屬粘液性細菌病，罹病泥鰍在鰭外緣先出現灰白色的病變，繼之各鰭條之間分叉、爛損而脫落。

治療方法：可用「富來頓」或「泰滅淨」等，以每噸水1~2克的有效劑量作長時間藥浴。

(2)若發現呈白色棉毛狀，則屬水黴病。為魚體健