

可不必施行灌溉，以免因水分過多，造成植株徒長倒伏。

注意防治病虫

台南選1號對銹病抗病性較弱，對露菌病免疫，對細菌性小斑點病耐病性強。因此，在發芽初期及開花前後應注意蟲害及銹病等的防治工作。防治方法如下：

1. 病害：對產量及品質具有嚴重損害的病害有銹病及紫斑病。銹病可使豆莢及種子不能充實飽滿，紫斑病則可使種皮變成紫色，以致不符合保價收購的條件，2者均可採用80%錳乃浦可濕性粉劑400倍液防治。

2. 虫害：為害大豆的害蟲計有潛蠅、蚜蟲、夜盜蟲、切根蟲、浮塵子、夜蛾、毒蛾、擬尺蠖、豆螟、椿象類、紅蜘蛛及薊馬等。依照大豆生長的一生訂定防治曆如下：

①播種時：使用3%加保扶粒劑每公頃40公斤平均撒佈於播種溝中，覆土後再行播種，如使用機械播種可與肥料混合施用，以防治潛蠅、蚜蟲、紅蜘蛛等害蟲為害。

②生長期：使用90%納乃得可濕性粉劑稀釋2,000倍液防治夜盜蟲及切根蟲為害。

③開花前：使用45%一品松1,000倍或90%納乃得可濕性粉劑2,000倍，防治夜蛾、毒蛾及浮塵子等為害。

④結莢期：花凋謝後豆莢形成時，使用50%加保利可濕性粉劑500倍或90%納乃得可濕性粉劑2,000倍，防治夜蛾、擬尺蠖、浮塵子、椿象類、蚜蟲及豆螟等為害。

⑤紅蜘蛛：使用50%加利可乳劑1,000倍防治。

⑥薊馬：使用50%達馬松乳液1,200倍，每2星期噴1次防治。

適合機械收割

台南選1號依季節的不同播種後大約85~103天當葉片變黃脫落、莢果乾枯變為褐色時，即可收穫。收穫可採用聯合收刈機，收刈、脫粒、精選、裝袋可1次完成，或利用鐮刀從地面上刈取，晒乾1~2天後再利用脫粒機脫粒。脫粒後的大豆種子隨即再乾燥至水分13%以下，並予調理後即可貯藏或送當地農會收購。



日本三共株式會社榮譽出品
立枯病特效藥!!

日本原裝進口
登記證：經進字0889號

立枯靈30%液劑

立枯靈的特長

- 能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
- 能促進根群發育，防止根部老化。
- 能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
- 能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
- 能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
- 無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

徹底消滅土壤病菌

培育健苗必備良藥

讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質



台灣總代理

中國化學製藥股份有限公司
1952-82 台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 實昌貿易股份有限公司
台北市敦化南路514號之3參樓
電話：7052414 · 7050155