

症狀

火雞的病狀是頹喪、垂翼、縮短頸部或將頭部伸入翼下竝立離羣，食慾不振。排黃綠色或褐色下痢便



夏季飼養火雞，注意雞舍的清潔，以及飼料的衛生。



飼養火雞，不得與其他雞隻混養。

，是本病之特徵。到了末期因血行障礙，頭冠部鬱血，呈暗紫黑色，因此稱為黑頭病（Black-head）。

病變

黑頭病死亡的火雞，最大的病變特徵在盲腸和肝臟，剖屍時可以看到盲腸炎及肝炎。盲腸外觀很明顯的腫大，有硬感，腸壁肥厚膨大，內腔充滿著骯髒的乳酪樣滲出物或壞死組織塊。盲腸病變通常均見於兩側，但有時僅發生於單側盲腸。常見嚴重病例，盲腸壁被穿孔引發腹膜炎或盲腸癒着於腹腔壁甚至其他臟器。

同時，肝臟的表面散發或密發着大豆大、指頭大的黃色、黃綠色圓形的壞死病變。切開時，肝臟組織內也可發現相同變化。但雞隻肝臟病變比較輕或缺少病變。

如何防治

黑頭病尚無特效藥可治。有人報告硫二苯胺（Phenothiazine）可得滿意效果，有人試用磺胺劑未能得到良好效果，据近年的報告 Ronidazol 具備良好藥效。

本病應以預防為重。曾經發生本病的土地，須休閒一段時間，刈草焚燒，翻耕土壤風化並經消毒始可再養火雞。

前面述及雞是本病帶虫者，所以養火雞不要混養其他雞隻，火雞及雞必須經常驅除盲腸虫，以切斷中間媒介路線，如此即可防止黑頭病的發生。



原裝進口 歷史悠久

最純正
蓖麻籽粕

含有成分：
氮 6%
磷 2%
鉀 1%
有機物 91%

土壤改良 最佳有機質肥料

泰國蓖麻油工業公司（直接販售）

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社

服務處：(02)7044259 泰坦企業公司

(052)541017 林木榮 (045)874571 農友行

(036)663659 張金海 (089)322767 陳啓明

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、
柑桔、蕃石榴、蘆筍、
枇杷、櫻桃、荔枝、蓮霧
茶樹、蕃茄、草莓、菸草
蔬菜、瓜類、豆類、
甘蔗、蘿藦、花卉。