

習慣攝食人工飼料，且體長已達10公分左右即可放養成池。

體型：魚苗在培育過程中已經過數次大小選別，每一池中放養之魚苗大小需一致，放養之魚苗体型最小需在4公分以上，最好是超過10公分，愈大活存率愈高。放養時間約在四月初，水溫已上升後為宜。

密度：單位面積放養端視水源之水量大小、水質、魚池設備、管理方法與魚體大小等而定。一年魚養成池每平方公尺放養2.5尾，以下雜魚、鰻粉及酵母粉配製成飼料飼育，養成一年之平均體重為715克，飼料轉換係數為2.06。活存率在70%以上。

養成一年之魚已可陸續出售。二年魚養成池每平方公尺放養1尾，繼續養成一年，其體重超過1公斤。在每公頃放養1萬尾每尾1公斤以上之養成池，以目前市價言，總值在200萬元以上。對於目前淡水魚類市價偏低情況下，值得鼓勵業者養殖七星鱸魚。

攝食人工飼料，其攝食情形是飼料落至池底前，趨前將整個顆粒吞下，落至池底之飼料不會再去攝食。因此，飼料以粒狀為宜，粒餌大小視魚大小而定。人工飼料需含高蛋白，可以鰻粉、魚粉、下雜魚漿、黃豆粉等來配製。

由於七星鱸魚不攝食沉到池底的飼料亦不攝食靜止不動的飼料。因此，最好能用投入水中不會馬上沉入底部的飼料，且能分散漂動如活的一般。

投餵的地點與時間需固定。投餵前仍如馴餌時一樣以物敲擊池堤使出聲響，待魚前來聚集一齊時再投餵。一般，日投餵二次，上下午各一次。日投餵量為魚總重量的5~10%。

剛開始投餵時，魚必活潑地搶食，當大部分已食飽時即漸散開，此時量宜減少讓少數未食飽者繼續攝食，等到快無攝食現象時即應停止投餵，以免浪費飼料，且避免殘餌堆積於池底惡化而影響水質。

飼餌

七星鱸魚為掠食性魚類，喜食活餌，經馴餌後能

放養後管理

七星鱸魚對於環境突然改變的抵抗力相當薄弱，

日本進口

為田園留下淨土， 讓果樹再現生機！

再生素(粉狀)

リフレッシュ®

- ▲去除生育障礙，恢復損傷元氣。
- ▲抑制病蟲發生，減少農藥使用。
- ▲增加地力，促進發芽、生根，成長快速，提早收成。
- ▲增進果實肥大及甜度。

以上2種肥料，可經葉面噴射或灌注地下，任何農作物均可施用，對人畜完全無害，可安心食用。2種混用更佳，經梨山、東勢鎮及卓蘭鎮農友使用過，效果不同凡響，有農友可證明：

葡萄——蔡禮順(045) 892390

柑桔——劉金標、詹德雲(045) 892228

幸水梨——廖秀麟(045) 892067

多木

多木X肥料

102年歷史

有機液體肥 2號 3號

- ▲收成後用2號，開花前一周用3號。
- ▲促進作物根群開根，增強水份及營養吸收力。
- ▲強化樹勢，增加結果率。
- ▲提高作物葉片及果實的肥碩，增加甜度。
- ▲收成後灌肥請施2號液肥(灌注)

台灣總代理：榮振木材工業股份有限公司

台北市安和路103號9樓之4

電話：(02) 7050125 · 7058853

苗栗縣總經銷：卓蘭鎮農會 電話：(045) 892063

東勢鎮經銷處：多木實業社 東勢鎮東關街64-7號

電話：(045) 874926