

稍不小心即容易發生斃死現象。因此，管理工作非常重要，需特別注意的有：

1. 每日巡視魚池瞭解情況。尤其是清晨、傍晚及無風悶熱之時，最需防止氧氣之不足，此時應注水等增加水中含氧量。

2. 嚴防含有工廠廢水、農藥等之水流入池中，否則可能整池斃死。

3. 養殖池水不可過肥，但亦不可過於貧瘠太清澈。水過肥則透明度低，夜間常會造成水中溶氧不足。所以池水過肥需換水注水使之稀薄提高透明度。

過於貧瘠則池中易長水草、青苔等阻碍魚之活動及使魚受到纏繞而死亡或是在夜間造成氧氣不足。一般池水透明度宜維持在35公分左右。

4. 餌料中營養成分需平衡，另需適量添加維生素和微量元素，以補充飼料原料中之不足，以免營養失調。

放養後1~2月內需分養。由於七星鱸魚之生長彼此差異甚大，若不實施分養，存活率低且收穫量銳減。分養或換池時宜選天氣良好時行之，以免環境改變過巨，切忌重覆地捕撈，否則極易發生大量死亡。

養成一年魚體重已超過一斤，可逐次間捕整年出售。若欲以活魚方式運輸，可在活魚運輸容器內酌加

海水，以增強長途運輸能力。

病害防治


七星鱸魚發病率比其他淡水魚少，但由於環境激烈變化或是不當之捕捉造成之死亡率頗高。比較常見的疾病是水黴病，此主要是由於皮膚受傷，而水溫又低時受到水黴菌感染而致病。斃病魚體裏有白色菌絲叢生，行動遲緩，食慾不振，游泳無力，離落羣單終而斃死。

其預防方法是儘量避免於天寒時網捕，而在捕捉時儘量避免魚體受傷。若發現有水黴病可以用1ppm孔雀綠溶液消毒15~20分鐘，或用10%海水浸泡10~15分鐘，每天一次直至痊癒。

另一為失明症，其發生原因有二：一是平時網捕時，眼睛受到機械性意外傷害或被其他魚棘刺傷；另一原因可能是由於飼料所含營養失調所致，由此引起症狀整體性的，全池魚均患，造成嚴重損失。

其防治方法是配製營養完整且平衡之飼料來養魚。其他由寄生蟲而引起的疾病，極為罕見可說沒有。

エプラン



益農土系列產品：

1. 益農土
2. 益農土育苗床
3. 益農土塊
4. 益農土床

本產品與石棉成分完全不同，無礙人體健康，敬請安心使用

精緻農業的主流 益農土栽培系統

從育苗到成株、收成，可一貫作業，並可自動化的栽培新技術。益農土主要成分為矽酸鈣，是最好的土壤改良劑。

益農土特點：

育苗：無菌、無雜草種子，保水性、通氣性良好的成長環境，可提高幼苗成活率。

專業栽培：移植時不傷根苗，免除更換植材之麻煩。利用養液栽培，可生產高品質的均一成品。益農土可單獨或混合其他栽培介質使用。

設施園藝：設施內之益農土床可重覆使用，可徹底解決土耕連作障害，增加設施利用率。設置方式簡易，可自行配置。

家庭園藝：重量輕，不生蚊蟲，不污染居室環境，容易照顧。自行栽培清潔蔬菜及瓜果、花卉，既衛生又安全，同時讓兒童觀察植物生長過程，達到親子教育的目的。

新日鐵化學株式会社

台灣總經理



丸豐有限公司

台北市南京西路30號11樓之1
電話：5422009·5222296

※誠徵各地區經銷商