

亦已伸入土壤深處可吸收水分，所以確定有缺水現象，如表土變白或葉片發生捲葉情形時，再行濕潤灌溉即可，只要不致影響產量，不必行定期灌溉。

全生育期間麥田內不宜有積水狀態，所以灌溉時應注意切勿積水，如遇降雨量多時，應立刻排水。土壤太濕或浸水，濕氣迂迴不散的地方，易使小麥根部養分吸收及光合作用受阻，影響生育，以致葉片黃化，若再遇高溫，則易發生蚜蟲為害及誘發白粉病、銹病等病害。

### 雜草發生不嚴重

冬季裏作不整地栽培小麥，由於沒有打破表土；且有乾稻草或草灰覆蓋土面，所以雜草的發生較少，只要拔除較大的雜草即可。

### 抽穗前後防病蟲

小麥栽培恰為低溫乾燥的季節，病蟲害發生較少，但在抽穗前後如遇到高溫、多濕、多霧的氣候，容易誘發銹病及白粉病，如發現初期病癥，應即時施藥防治。

### 小麥銹病

小麥銹病專寄生於有生命的植物體上，無法在死的植株上繁殖。病斑發生於葉身、葉鞘或稈及穗上，尤以葉上最多，初期形成不規則的褐色病斑，即夏孢子堆，摸起來如同鐵銹。散放孢子，四處傳播。此病多發生於抽穗後，很少於抽穗前發病，通常在12月下旬至1月上旬之間，多霧多濕的氣候下較易發生。

防治方法：

(1)栽培抗病品種：如小麥台中選2號品種，即對銹病具有免疫性，小麥台中33號對葉及莖銹病抗病性亦強。

(2)使用藥劑防治：可用65%鋅乃浦（Zimeb）或銹錳乃浦（大生M31，DithaneM31）等可濕性粉劑，每公頃每次用藥量為2~3公斤，稀釋400倍，在12月下旬噴藥1次，隔14天後再噴第2次，如發病嚴重，應做第3次施藥防治。

### 小麥白粉病

白粉病與銹病相同，是在抽穗後，多濕、露重的氣候下發生較多。成熟期更見猖獗，在葉、葉鞘、稈、穗等部位均可發生。如發病嚴重會影響植株的光合



## 大順牌小型農機系列

造福農友 大順當先

#### TS-651-K 7馬力汽油中耕機

適用於：各種作物如蔗園、煙園、菜園等之中耕、除草、開溝、培土。




#### TS-651-D 6馬力柴油中耕機

適用於：各種作物如果園、茶園、豆園等之除草、中耕、培土、開溝。



#### TS-721 綜合播種機

適用於：粒狀種子之播種。如花生、玉米、大豆、高粱、芝麻等。



#### TS-528 強力<sup>5</sup>/<sub>7</sub>馬力

單輪中耕機  
可附掛TS721-A單行播種機  
適用於：坡地作物、花生、花園、玉米、高粱等行距狹窄作物。



建凱企業股份有限公司

台南縣麻豆鎮麻口里1-16號  
TEL: (06)5702065~6-5702161~2