

作用，以致麥粒不飽滿，植株乾枯倒伏，影响產量。

防治方法：

(1)白粉病對寄主選擇性大，可栽培抗病品種台中選2號防治本病。

(2)不可密植，注意通風及光照。

(3)注意施肥，勿偏用氮肥，酌施鉀肥可增加抵抗力。

(4)使用三得芬乳劑 (Tridemorph)，每公頃每次用藥量為0.6公斤，稀釋2,000倍，開始發病時應立即噴藥，以後每隔10天施藥1次。

### 蚜虫

蚜虫發生盛期是在每年晚秋至翌年早春，為害處有黏性的分泌物及若虫白色的蛻皮，被害小麥植株發育不良及枯萎。

防治法：

(1)使用24%納乃得溶液 (Lannate)，每公頃每次施藥量0.9~1.2公升，稀釋1,000倍，生育初期如發現蚜虫，即行噴藥防治，每隔10天噴藥1次，計2~3次。

(2)使用40.64%加保扶水懸粉 (Furadan)，每公頃每次施藥量1.1~1.5公升，加水稀釋800倍，施

藥2~3次。

### 收穫後確保品質

全麥田的90%完熟時即可收穫，台中31號約在抽穗後55~60天。台中選2號約在抽穗65~70天為收穫適期。目前不整地栽培的小麥均利用水稻聯合收穫機收穫，一次可完成收割、脫粒、風選及裝袋，每天可收穫0.7~1公頃。

脫粒的麥粒應立刻乾燥，可送至晒場晒乾或利用循環式乾燥機乾燥，但溫度不可太高，避免種子熟死、發芽率低落或影响品質。用循環式乾燥機的效率較高。

乾燥完成後即可裝袋或貯藏，如公賣局製作栽培者，小麥收購標準為：麥粒水分13.5%以下、夾雜物2%以下、澱粉價60%以上、蟲蛀粒1%以下、每公升容重量725公克以上、充分完熟粒90%以上，且麥粒大小均勻不變形，顏色鮮美。如留供種子的麥粒，於貯藏期間須每隔1~2個月翻曬1次，以確保發芽率。為防止穀象虫為害，可用0.2%靈丹 (Lindane) 粉劑以1:800拌勻後貯藏，或使用5%的保滅丹 (Bromodan) 粉劑以1:1500拌勻後貯藏。 ■

## 提醒農友!!

蓮霧

催早花

請繼續愛用 亞拉斯加紅人牌 魚精開花肥  
花寶三號

果實肥大

請信用 花寶二號 的效果

提高品質  
果實甜脆  
耐貯藏運輸

天然高鈣質 鈣元<sup>®</sup> CALGEN 包您滿意

詳細情形  
請洽

代理 台和園藝企業(股)公司  
台灣總經銷 台北市士林區中正路104巷1弄2號

台北：(02) 831-3302  
台中：(04) 222-3374

嘉義 (05) 276-1033  
高雄 (07) 384-6376