

的防治效果較好。

(2) 藥劑配方

葉斑病的防治藥劑配方有：添加礦物油與不添加礦物油兩大類，而黑星病的防治藥劑配方可以不添加礦物油，以降低防治成本。添加礦物油的藥劑配方為每公頃使用香蕉礦物油 6 公升，加展着劑（「出來通」X-114或X-45）72CC，再加下列任何 1 種藥劑，最後加水至 30 公升：80%「鋅錳乃浦」可濕性粉劑 2.8 公斤，80%「錳乃浦」可濕性粉劑 2.8 公斤，50%「免賴得」可濕性粉劑 0.6 公斤或 28%「比多濃」乳劑 0.42 公升。不添加礦物油的藥劑配方為，每公頃使用 75%「四氯異苯腈」可濕性粉劑 1.5 公斤，或 25%「普克利」乳劑 0.4 公斤加水至 30 公升。


(3) 施藥時期與方法

中部夏秋蕉栽培區，自 4 月中旬～9 月下旬，每月施藥 2 次，而南部春夏蕉栽培區，自 5 月中旬～12 月下旬止，5 月與 12 月各施藥 1 次，6 月～11 月間，須視雨量多寡及其他氣象因子，每月施藥 2～3 次。施藥工作，應於溫度 30°C 以下和風速每秒低於 5 公尺時行之，以動力微粒噴霧器，將藥劑噴射在香蕉心

葉及其他葉片。

(4) 果房保護

由於黑星病會感染蕉果，所以要做果房保護工作，其方法是以 80%「鋅錳乃浦」可濕性粉劑 40 倍加展着劑「出來通 X-114」1,000 倍，於香蕉抽穗後，第 2～3 片苞片脫落時，作第 1 次噴藥，經 7～10 天，在摘花、去舊和整房時，作第 2 次噴藥，並於施藥後套袋，以阻隔新的接種源。又塑膠袋上端應與果軸綁緊，以免病原菌孢子隨着雨水或露水，沿着果軸流下來感染蕉果。



日本進口

為田園留下淨土， 讓果樹再現生機！

再生素 (粉狀)

リフレッシュ®

- ▲去除生育障礙，恢復損傷元氣。
- ▲抑制病蟲發生，減少農藥使用。
- ▲增加地力，促進發芽、生根，成長快速，提早收成。
- ▲增進果實肥大及甜度。

以上 2 種肥料，可經葉面噴射或灌注地下，任何農作物均可施用，對人畜完全無害，可安心食用。2 種混用更佳，經梨山、東勢鎮及卓蘭鎮農友使用過，效果不同凡響，有農友可證明：

葡萄——蔡禮順 (045) 892390

柑桔——劉金標、詹德雲 (045) 892228

幸水梨——廖秀麟 (045) 892067

多木

多木 X 肥料

102 年歷史

有機液體肥 2 號 3 號

- ▲收成後用 2 號，開花前一週用 3 號。
- ▲促進作物根群開根，增強水份及營養吸收力。
- ▲強化樹勢，增加結果率。
- ▲提高作物葉片及果實的肥碩，增加甜度。
- ▲收成後應肥請施 2 號液肥（灌注）

台灣總代理：榮振木材工業股份有限公司

台北市安和路 103 號 9 樓之 4

電話：(02) 7050125・7058853

苗栗縣總經銷：卓蘭鎮農會 電話：(045) 892063

東勢鎮經銷處：多木實業社 東勢鎮東關街 640-7 號

電話：(045) 874926