



種鵝的繁殖

本省種鵝的繁殖季節在每年9月到翌年5月，（中國鵝約提早1個月），初期及末期產蛋量較少，12月至翌年2月間最多。普通1隻公鵝可配3~4隻母鵝，但配種隻數需視鵝隻品種及體型大小來決定，如加拿大鵝是1對1。大型種鵝如土魯斯鵝（Toulouse Goose）和愛姆登鵝，1隻公鵝可配2~3隻母鵝，小型鵝如中國鵝、白羅曼鵝或雜交鵝種，則1隻可配4~5隻母鵝。

公鵝應與母鵝在配種前，彼此必須相當熟悉，相處時間愈長效果愈佳，最好從小一起飼養。不然在繁殖季節期間，必須仔細觀察新組合的鵝羣，是否全部

配對，以免影響受精率。

通常母鵝每2天產1個蛋，生產10幾個後，即有賴抱意念。中國鵝賴抱性強，如不許賴抱，則行「覺醒」後20日，即可繼續生蛋。在產蛋時，更忌受到驚擾，以免到別處產蛋或停止產蛋，造成損失。因此，產蛋期間，絕對禁止做種鵝調動、防疫、注射等工作，以免造成種鵝的緊迫，導致減產或停產。

公母的鑑別



種鵝的性別鑑定，可分別從外型鑑定及肛門鑑定。在外型鑑定方面，成熟之公鵝較母鵝體型大，叫聲尖銳，母鵝的叫聲低沉。此外，公鵝的頭部及頸部稍大而長。

愛姆登鵝及白羅曼鵝等品系之初生1周齡雛鵝，可由其毛色深淺判明性別，雄鵝毛色較雌鵝毛色淡。

在肛門鑑別方面，先用左手大拇指與食指緊夾雛鵝之兩腿，並用中指及無名指頂住背部，使胸部向外，再用右手拇指輕壓雛鵝腹部，同時用右手拇指和食指將尾部下壓，翻轉雛鵝的肛門與皺襞，如為公鵝，肛門下端有粉紅色螺形突起物，約3公厘。母鵝之肛門皺襞翻轉後，下端平平，且顏色較淡白。

成鵝之鑑別，則把鵝的腹部輕輕放臥地上，然後

日本岡恒牌高級園藝工具



* 原裝進口，歡迎選購 *
請認清商標，謹防假冒。

鋼質最優秀！
設計最實用！

其他：洋蔥鉗、松葉鉗、刃物用油砥石

經銷處：新高貿易股份有限公司
台北市峨嵋街68號 電話：3314190
郵撥儲金台北市0015195—5

刀身及紙盒無岡恒入級標誌者，均屬假冒品，若提供線索而破獲侵犯本公司商標者，當致薄酬。