

由另一人協助，抓翅和腿，便可開始檢查，一手手指輕壓靠近尾部的肛門部分，再輕輕的向尾部壓下，而另一手在肛門的另一側的腹部上下輕而堅實的押撫，如押撫適當，則肛門張開，露出內部，若為公鵝，即可看到陰莖，陰莖呈螺旋狀，長約3~5公分，包藏於排泄腔壁上之陰莖鞘內。母鵝則在排泄腔前有一小突出物，頗似鵝的陰莖，如不細查很容易誤會。

種鵝的營養

飼養種鵝與肥育鵝應分開飼養，並採行限食制度。每日每隻供應含粗蛋白質15%之完全飼料120~150公克，另加優良青料，如盤固拉草、三葉草、苜蓿、狼尾草等，並使種鵝充分運動，以免身體過胖，而影響產蛋量及受精率。在繁殖季節前1個月，改用含粗蛋白質17~20%種鵝飼料，每日餵飼2次，（完全飼料每日每隻160~200公克）每日並在餵飼過後，觀察鵝隻攝食情形，通常鵝隻攝食習慣，為先食青料後食精料，並採多次攝食。繁殖期之母鵝，食物消化時間，約需3小時，停產母鵝6小時，抱蛋母鵝10~12小時，在餵飼後，並需隨時觀察種鵝的生長狀態，以做為調整飼料參考，有時因天氣太熱，鵝隻胃口較差，應減少飼料量，以免殘留腐敗。

鵝之營養需要量

(以%或每公斤飼糧中含量表示)

養 分	初 期 0~6周	生 長 期 6周以後	種 鵝
代謝能 (大卡/公斤)	2,900	2,900	2,900
蛋白質 (%)	22	15	15 a
離胺酸 (%)	0.9	0.6 a	0.6 a
維生素A (IU)	1,500 a	1,500 a	4,000 a
維生素D (ICU)	200 a	200 a	200 a
核黃素 (毫克)	4	2.5 a	4 a
菸鹼酸 (毫克)	55	35 a	20 a
鈣 (%)	0.8 a	0.6 a	2.25 a
磷 (%)	0.6 a	0.4 a	0.6 a

註 a 是估計值。其他養分需要量，未有列出者，可參考雞之營養需要量。



日本三共株式會社榮譽出品
立枯病特效藥!!

日本原裝進口
登記證：經進字0889號

立枯靈30%液劑

立枯靈的特長

1. 能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2. 能促進根群發育，防止根部老化。
3. 能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4. 能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5. 能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6. 無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

* 讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質 *

徹底消滅土壤病菌

培育健苗必備良藥



台灣總代理

中國化學製藥股份有限公司
台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 實昌貿易股份有限公司

台北市敦化南路514號之3參樓
電話：7052414 · 7050155