



仙草播種 種子須先消毒

問 仙草苗如何育種？我曾經試播4年沒有1次成功，播種時間在農曆正月。或讓其自然下種，亦不見發芽。（斗六市重光路11~3號張谷昇）

答 (1)農試所前曾經辦理仙草種子發芽試驗，經用「次氯酸鈉」1%消毒10分鐘後，又以蒸餾水清洗10分鐘，置入室內觀察，發現10~15天後發芽率很高。同時間觀察田間自然脫落種子發芽情形，於2月調查亦發現株旁小苗數很多。你試播4年未成功，可能方法不正確。

(2)建議你應作下列措施：

①種子需篩選充實的。從株上採收後，儘量以陰乾方式乾燥，乾燥後，應密封置於冰箱內貯存。

②播種前，需用1%「次氯酸鈉」消毒10分鐘，然後用清水沖洗乾淨，陰乾，再與細土混合，播於播種床。

③播種後，上覆稻草，適時澆水，保持濕潤，但不可澆太濕。

④播種期間，國曆11月底就可開始。（胡敏夫）



仙草開花（廖敏卿攝）

繁殖孟宗竹 多用母株移植法

問 孟宗竹在什麼時候種植較合適？應如何育苗？（高雄縣六龜鄉中興村138號葉秀能）

答 (1)孟宗竹苗於地下莖側芽只略膨脹，即將發芽時採掘為宜，本省中部地區約以9~10月間，為掘苗出栽的適期。

(2)孟宗竹的繁殖方法有：母株移植法（地下莖帶母株移植）和地下莖移植法兩種。地下莖帶母株移植，較地下莖單獨移植，成活率高，成長亦快，為一般農民樂於採用，但若行大面積造林，每感母竹來源不易。

(3)孟宗竹竹苗的來源不易，一時難於獲得大量竹苗，補救方法有二：

①可先採掘地下莖（不帶母竹稈）於苗圃中培育，埋植時，將地下莖側芽分向兩側，不可上下排放，經培育成竹苗後，再將地下莖連同萌發的竹稈，掘取定植。

②孟宗竹林經皆伐後，會萌發數多而細小的竹稈，所以可在林緣皆伐小面積竹林，用以培育竹苗。（張添榮）



孟宗竹林

台農二號木瓜 不耐毒素病

問 我有1塊山坡地，今年想種木瓜。請問：

(1)用怪手挖1個大約2台尺深的大洞，把木瓜種在其中，待長大以後，施糞便和三要素，然後覆兩尺的土。這樣木瓜從根部到母幹就有兩台尺在泥土內，母幹是否會腐爛？或是會再由母幹旁生根？

(2)木瓜的行株距若干最適宜？

(3)紅幹的耐病品種，為何糖分低，難吃？

戶籍如有變動

律問題解

印鑑證明書—— 須重新辦理

屏東縣恆春鎮中山路 186號黃耀炯
先生問：

我母親向法院標得 1 棟房屋連同基地，原先打算給我二哥開設醫院，所以登記他的名義，但曾經言明，如果他要定居美國，不在台灣開設醫院，即應變更登記為我的名義。而他早已全家搬往美國，所有證件，包括印鑑、印鑑證明書，所有權狀等都在我手中，但皆已歷經 20 年，是否仍可使用，藉以辦理變更登記？

高瑞錚律師答覆：

依現行登記實務，如戶籍不變動，印鑑證明書即無時間限制，繼續可供使用。問題是，你二哥舉家出國定居多年，他的住址既有變更，至少印鑑證明書已不可能繼續使用，仍請洽詢管轄地政事務所或委託代書，重新備辦申請書、委託書，現值申報書、及其他一應書件，循序辦理所有權移轉登記。

(4) 種何種品種最好？施何種肥料最適當？如何施肥？（屏東縣恆春鎮城北里中山路 186 號黃耀炯）

答 (1) 除非 1 年生以上的老莖，否則木瓜莖基不能埋深達 2 台尺，以免腐爛。

(2) 木瓜定植行距 8 ~ 9 台尺，株距 5 ~ 6 台尺。

(3) 紅莖（幹）的耐毒素病木瓜新品種，因為產量高，糖分較低，此乃品種特性，加強疏果及施肥可改善。

(4) 目前以「台農二號」最受歡迎，但毒素病較嚴重。木瓜除重有機肥外，三要素化學肥料的適當比率為氮：磷：鉀 = 4 : 8 : 5。小株以環施或穴施，成株以撒施為宜。（王德男）

香蕉酒精催熟器 方便實用

問 數年前，貴社曾報導過香蕉酒精催熟器，請問此種催熟器是否實用？何處有售？（台南市國安街 156 巷 74 號謝慶順）

答 酒精催熟器，已經在台灣各大香蕉加工場（廠）使用中，特別是中、北部大部分已用酒精催熟香蕉。可向「板橋市中山路 2 段 1 號農友香蕉行郭源平先生，電話：(02) 9511610」洽購，售價約每台新台幣 20,000 元。（黃恩雄）

肉牛消化不良 可灌服味噌液

問 我有 1 隻肉牛，過去都吃得正常，半個月前發生後腳向旁開，無法站起來，經過治療，現在

會站起來，但還沒有完全恢復。又，吃飼料後，草料吃得不多，腳上受傷有個大洞，應如何治療？（雲林縣崙背鄉下街路 42 號鍾慶孝）

答 您的肉牛後腳旁開，無法站立。如果牛沒有發燒的話，那可能是腳部受傷引起的，目前已能站立，只要再好好調理，應該不會再有問題。

草吃得少，可能胃的消化有些問題，可到藥房買些牛馬藥如「安牛羊」（萬力反芻動物藥品）灌服。或者到雜貨店買些煮湯用的味噌，每次 5 塊錢的味噌量，加水 3 ~ 4 公升攪散後灌服，每天 2 ~ 3 次。

腳部的傷口，可能是臥地太久，壓迫磨擦引起的。您可到西藥房買些黃藥水，或買「阿苦利奴兒」（Acrinol）丸劑自己泡，每丸加 50CC 冷開水。清洗傷口後，再將沾濕的黃藥水紗布敷上，外面再用綑帶或膠帶包住，約 1、2 天換 1 次藥，直到癒合。（吳錦賢）



（阿丰攝）