


剪除燒毀病枝葉  
發病初期應即噴藥

防治方法如下：

(1)配合整枝修剪工作，剪除患病枝梢及葉等燒毀處理，生育期間並注意肥培管理及疏果，以減少著果數，恢復樹勢。

(2)藥劑防治：以50%「免賴得」可濕性粉劑 (benlate) 每公頃用藥量 0.3~0.4公斤，稀釋倍數 3,000倍，於發病初期開始，每隔10天施藥1次，計需2~3次，「免賴得」易使病原菌產生抗藥性，應與其他藥劑如「三泰芬」、「芬瑞莫」及「撲克拉」交替使用。 ■



柑桔白粉病生活史

病原菌可越冬  
翌春再次感染

病原菌以菌絲形態越冬，到了冬末或翌春，菌絲恢復活動，伸長蔓延在幼葉、新梢等感染部位出現白色粉末狀病徵，並產生大量分生孢子，作為第2次感染源。

信用的標誌

純天然  
(未脫棉一保證品質)

棉子粕

六和製有機質肥料

含有成分：  
氮 4.5-5.5% 鉀 1.5-2.0%  
磷 2.5-3.0% 有機物 87%



適用作物：  
各種果樹、  
蔬菜、豆類、  
花卉。

各種產品詳細資料  
歡迎洽索。

蓖麻粕

印度原裝進口·有機肥料

含有成分：  
氮 5.5-6.5% 鉀 1.2%  
磷 2.8% 有機物 82%

農業化學品及資材

- 蓖麻粕(Castor meal)：印度原裝進口，最優良有機肥料。
- 海藻精(海中肥®Seaweed extract Powder)西德進口，最好的葉面施肥劑，效果最快。
- 優肥®(Micro nutrient)綜合有機微量元素。
- 腐植酸(Humic Acid)①腐植酸粉、②含鎂腐植酸、③水溶性腐植酸。
- 各種植物生長調節素： $\alpha$ -NAA、SNA、IAA、IBA、GA<sub>3</sub>、6-BA。
- 其他農業化學品：西德進口鉬酸鈉、磷酸-鉀、磷酸-鈣；日本進口銅酸銨、美國進口硫酸錳；法國進口之螯合態微量元素(E. D. T. A)。
- 各種農業噴嘴：日本進口各型各式噴嘴。
- 土壤改良劑(Zeolite)：改良土壤之酸化，加強肥料效果，防止生理障礙。

六和化工股份有限公司 台北市中山北路三段47號7F ☎(02)5954321轉農業部  
高雄分公司：高雄市洛陽街29號 ☎(07)2822801·2822803陳先生