

，可經由種子、土壤或空氣傳染，因此防治方法亦常多所兼顧，應慮及下列各項問題。

(1)溫度管理：育苗管理中，最重要為溫度管理。一般稚苗的場合，催芽溫度為 $30\sim32^{\circ}\text{C}$ ，經2~3天；綠化時期，日間溫度 25°C ，夜間 20°C ，經2~3天。硬化時期，晝間 20°C ，夜間 15°C ， $14\sim16$ 天。此種溫床管理方法才合乎標準。

(2)床土的選擇：選擇適宜床土，為控制土壤環境，以達到控制苗立枯病發生的一種方法。床土 PH不僅影響苗枯病的發生，亦左右秧苗的生長勢，作為床土的土壤，以 PH 4.5~5.0 間酸性土壤為佳。

(3)藥劑防治：藥劑處理為防治苗立枯病最主要的方法，目前所推廣防治方法如下表：


藥劑名稱	每箱施藥量	稀釋倍數	施藥時期
30%殺紋寧溶液 (Tachigaren)	0.5C.C.	1,000倍	播種覆土後，立即施藥。
25%依得利乳劑 (Terrazole)	0.25C.C.	2,000倍	同上
35%依得利可濕性 粉劑(Terrazole)	0.17公克	3,000倍	同上

使用農藥，先看標示說明，注意採收前停止用藥日數，以避免農藥殘留。

施藥時注意風向，戴口罩，穿保護衣褲，避免身體受害。

台灣省政府農林廳

農藥 使用技術指導專欄




豐洲自動化高效率農業機械

果農的得力助手—FK-18圓盤式洗選果機

零故障、分級正確、不傷果皮、節省人力、增加收益。
20年專業經驗，性能保證。農會指定機種，果農必備。


特點：

- 自動選果，分級裝箱。
- 采用圓盤式選果機，運轉穩定、快速，規格自行調整，適合柑桔、梨、柿、葡萄柚、香瓜、檸檬、洋蔥等各式瓜果選別，完全符合內外銷需要。



為農村創造財富—FK-2全自動製繩機

全省草繩製造業指定使用機種，生產之草繩柔軟均勻，表面光澤美麗，草繩市場潛力大，內外銷受歡迎。



歡迎農友蒞臨參觀

豐洲企業股份有限公司

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段45號
電話：(05)2262265 • 2263666