

各施藥1次做比較時，以傍晚防治效果較佳，早晨次之，中午最差，此結果與其在冬瓜心芽或莖葉上活動頻繁與否有關。

其他應注意事項

(1) 避免連作及老株旁種植冬瓜，發生嚴重地區，下期作應避免再種瓜類或茄科，以免殘土中的蛹，羽化後，迅速為害新定植瓜株，接近收成的老株，往往已停止施藥，造成薊馬大量孳長，如在鄰近新植瓜苗，必很快的就被遷入為害。

(2) 清除雜草，南黃薊馬的寄主廣泛，有數種雜草亦成為其寄主，所以在瓜苗移植前，田間田梗雜草務必盡除，以減少虫源。

(3) 根據本場試驗發現，南黃薊馬成虫對白色有喜好性至為明顯。冬瓜園內距地面50公分處，垂直懸掛


白色黏虫板，可誘得多數南黃薊馬成虫黏着於白色板上，因此可利用此種白色黏板，做為偵測其發生的工具。

(4) 南黃薊馬常匿藏在冬瓜株上的茸毛，或未完全展開的芽間潛行食害，表面噴藥難以接觸毒殺，又該虫的假蛹是於土中棲息，不易防治。因此施藥時，應把藥液均勻噴在冬瓜葉面與葉背，以提高防治效果。

(5) 本虫口器為銼吸式，因其體小淡黃，初期為害不易為人察覺，成虫活動力強，喜藏在瓜株茸毛間，受驚動時，迅速躍足逃竄，且對多數藥劑易產生抗性，所以宜輪用不同種類的藥劑。

使用農藥，請注意使用範圍、防治對象、使用方法、採收前停止用藥日數。

台灣省政府農林廳



日本進口

フマキラー 植物活力劑

伏魔起樂—寶多液—ポットイン

效果超群，適用於各種植物的活力劑：

舉凡：蘭花、仙人掌、堇花、盆景、盆栽等。

任何植物在……

- 開花前後
- 株體缺乏活力
- 移株軟弱
- 葉子容易蛀蟲
- 嚴寒受凍
- 陽光不足
- 盛夏保持元氣
- 花葉失去光澤
- 生長緩慢時 → 只要這一支就够了！

輕便！
易用！
效果好！

一支可提供10~20天注入量的營養劑

創立於1924年，產品暢銷一百多國，歷史悠久，信譽卓越。

日本フマキラー(伏魔起樂)株式會社榮譽出品

經銷代理商：新高貿易股份有限公司

台北市峨嵋街68號 TEL:(02)3314190 郵政劃撥0015195-5

成份：氮、磷酸、鉀、鎂、錳、銅、亞鋁、鈣素、鈣、鋁、硅