

美國芹菜(青梗)

# 春季蔬菜

## 美國芹菜

又稱西洋芹菜、洋芹菜、金白芹菜、巨無霸芹菜、沙拉芹菜。是繖形花科洋芹屬1年或多年生草本植物，莖肥厚寬大粗長，每株有葉柄10支以上，全株重約2~2.5公斤，是本省普通芹菜重量的20倍以上。

開白色小花，種子淺褐色，表層有細絨毛。葉片結構和普通芹菜相同，但較寬大，葉柄長有30~40公分，寬有2~3公分，厚達0.15~0.25公分。品種依梗色分白梗種及青梗種，依種子來源分美國種和日本種。

適合本省秋冬季氣候種植，而於冬、春季採收，每年12~3月盛產，10~11月及4~6月淡產，7~9月缺貨時，由國外進口（美國或日本）少量應市，以滿足餐廳料理店之需要。本省產地在西螺、二崙、溪湖、大城、埔心、新港及台北近郊盛產，其餘各地零星栽植。

### K-145S中耕管理機

汽油引擎，電子點火，強力5和7馬力。  
操作簡便，省油，好保養，採用安全設計。




◎本機種可辦理農機專案低利貸款。

適用作物：果園、蔬菜園、花卉、蔬  
茶園作物。  
搭配套件：鐵輪、作畦器、標準刀  
具：中耕、除草、培土、剖畦、施肥、開溝、播種等作業。

### 超級8槽式—稻谷玉米高粱乾燥機


#### EC-505B

- 八槽式6大特點：
1. 高速率乾燥
  2. 特殊構造耐久性
  3. 自動清除、零殘留
  4. 升降機可前後對調
  5. 排風方向，任您選擇
  6. 安全控制構造




一次稻谷1500~7000台斤  
玉米2000~8500台斤  
耗油量：1~6公升/時  
(煤油或高級柴油)

### ST-500B型 綜合性貨櫃式乾燥機



玉米、稻谷、小麥、花生  
一次1000~5000公斤  
每小時乾燥率：0.3~0.9  
耗油量：2~5公升/時  
(高級柴油或煤油)



#### BL96B

菸葉、稻谷均可  
一次5000公斤  
乾燥有效面積：六坪  
吊扇層數：二層

順光一心子

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路三段81號 經測定合格  
TEL:(02)2606111~6(六線) 甲等廠商

• 吳昭其

# 產銷與分級包裝

行種子繁殖，9~12月撒播種子，15°~20°C是種子發育適溫，15°~25°C發育良好，以表土深厚鬆軟，富有機質黏質壤土適合種植，育苗至高10公分需時50天左右，移植本圃，畦寬1.2公尺，行株距20×15公分，注意排水，保持土壤濕性，施用利農土濃縮粒狀有機質當基肥，施化肥三要素3次，尿素2次，去除雜草，約100~120天左右，葉梗未枯黃，葉片未枯焦前採收。也可行培土，促進葉梗白色，增進質地細嫩。

採收時以利刀沿地面莖頭端割取，去除雜質枯萎葉，切掉外端粗梗之葉片，保留6~10片心葉，以橡皮筋在葉梗尾端套住，防止散開，放入紙箱內，每箱15公斤淨重。氣溫達到25°C以上或大太陽時，防止箱內悶熱，應用塑膠袋裝碎冰，放置箱內中層，以保持箱內冷凍，保護品質細嫩鮮脆，再運往市場批售。

含有高量鈣、磷、鐵、維生素A、C及纖維等營養，葉梗、葉柄、葉片均可食用。適炒食、作物、生食。

葉梗洗淨撕去頭端表層筋絲，切段沾沙拉醬或「哇沙米」，食之清香鮮脆。素炒魷魚、香菇、豬肉絲、牛肉絲、味美可口，一點兒也不會粗糙。或煮魚丸、木耳、香菇、草菇、排骨湯等湯料，鮮脆可口增進食慾。是低熱量多纖維的減肥佳餚，比普通芹菜更清香味。

購買時以葉柄肥大寬厚，無雜質或斑點，葉片完整無枯焦為上品。煮菜湯者以青色種，炒食或生食者選黃梗種。

## 梨瓜

別名隼人瓜、佛手瓜、香櫞瓜、佛掌瓜、萬年瓜、拳頭瓜、菜餚梨瓜、互瓜。是葫蘆科梨瓜屬多年生蔓性草本植物，在溫帶成為1年生，莖蔓有匍匐或攀緣性，生長及分枝強盛，可延伸長達10~20公尺。開小

活肥源 鐵肥要素  
精製鈣殼灰  
超級紅苦土

科學收管·  
理改的良品質·  
利能·  
中央標準局認定  
第88958號  
說明書來函即寄

土壤PH酸濕度計  
隨地·隨時可用  
用法簡便

糖度計

改良酸性土壤  
促進土地肥力  
補充微量元素  
提高糖分·香味  
提高品質·增加產量

洋菇專用鉀  
輕質碳酸鈣

和春

和春化工股份有限公司  
台中市文心路二段596號  
TEL:(04) 3260751-3260752

## 梨瓜



型淡綠色或淡黃色花，雌雄同株異花。果實長橢圓型，似梨而扁，果面有縱溝或縱皺紋，有如不握緊的掌頭面。果底有1扇平種子，與果肉連結一起，成熟時自然在果體發芽。

原產熱帶美洲，1917年傳入日本，1935年由日本引入本省。品種依果皮顏色分綠色種及白色種，白色種又有淡白色、淡綠色、淡黃白綠色，以上2種均具有刺及無刺2種。

全省各地均適種植，而以吳鳳、阿里山、竹崎、梅山、寶山、峨嵋等山坡地居多。每年5~9月盛產，3~4月及10~12月量略少，1~2月淡產。

喜溫暖略涼而雨量常久但平均的氣候，晝夜溫差大的山坡地，向陽面發育良好，生長期長久，產量甚豐，海拔300~800的稍傾斜地最適栽培，每分地全期可採收4,000~6,000公斤，終年生長結果不枯死。

利用種果繁殖或母蔓扦插，老熟果發芽露出子葉，定植於肥沃壤土，行株距5×5公尺，搭棚架或竹

子叉立，輕摘心摘頂（可當梨瓜苗出售）、施肥、數稻草、除蟲生外，很少病蟲害。定植至採收嫩果約需75~90天。

只要保持土壤濕潤，莖蔓不枯死，老熟果長芽自行掉落地土，生根長芽自行成長，連綿不斷有果實可採收。

採收食用嫩果者，宜趁果刺未生出，或果芽未長出前，握住果體摘斷果梗，不留果梗，用清潔柔軟棉布，擦拭果皮後，分別將果體之大、小，分開放入紙箱內，每箱以淨重20公斤包裝，運往市場銷售。台北市場每年交易量約700公噸，總平均單價每公斤9.13元，每天市場需量約1,000公斤，每公斤批發單價可維持10~15元。

嫩果適合炒食、煮物、醃漬。多半外銷香港或日本，量比內銷為多，約有7成外銷。購買時以果皮鮮綠色，果肩的細毛部分脫落顯出光滑，果面縱溝不明顯，果皮細嫩未硬化為佳。

註冊 商標  
品質的保證

## ●●●為您的豐收提供最佳的施肥用品●●● 使土壤和作物都成長

### 頂新複合 有機質肥料 8-6-6-3

8-6-6-3有機質肥料是針對台灣土壤所研製，N.P.K純係有機質配合，能讓您的果樹在開花、結果、根部分化都能發揮最大的效果。

### 脫棉壓榨 棉子粕

### 傳統壓榨 菜子粕

### 傳統壓榨 蓖麻粕

### 三要素 最均勻 有機質肥料

保證→不經化學  
溶劑處理 +

品名	氮	磷	鉀	鎂
8-6-6-3	8	6	6	3
棉子粕	5.38	2.61	1.9	0.68
菜子粕	5.5	2.5	1.3	0.5
蓖麻粕	5.5	2.83	1.2	



信賴的標誌

頂新製油實業股份有限公司 彰化縣永靖鄉永靖街60號 221166 (5線)  
台北電話 (02) 5418364 · 5813907