

(3) 注意田間衛生：

罹病果實，枝條或葉片應徹底剪除，並集中燒燬，以降低感染源。尤其是每年春季修剪催芽後，未萌發的芽，或者萌芽生長遲鈍，節間短小，葉片較黃較小的枝條，通常均已罹病，均應剪除。至於修剪或催芽後所造成的傷口，可以10倍「快得寧」或1,000倍「貝芬得」加以保護。

(4) 做好套袋工作：

套袋僅建議在鮮食葡萄上使用。套袋時機過去一直未有詳細研究，但依據筆者初步實驗資料，套袋時間應愈早愈好，但太早套袋，由於果軸還嫩，容易折損；因此最好時間大約在著果後3周左右為佳。過去建議在著果後45天套袋，但是由於時間太晚，病原已在其上潛伏，而且該期間已使用多次農藥，常使果粉發育不佳。


(5) 噴藥防治：

由田間調查及接種試驗知，苦腐病發病高峯在生

育後期，但這時候用藥，往往效果不佳，而且反造成農藥殘留，因此防治本病，應早期便開始用藥，目前經過田間初步篩選，較有效的藥劑是「貝芬得」1,000倍、「四氯異苯腈」500倍、「免賴地」1,000倍、「撲克拉錳」5,000倍等，筆者認為宜自萌芽3~5葉後便開始用藥，上述藥劑輪流使用，但需在採收前20~30天停止用藥。上述方法及防治藥劑因未經正式委託試驗，所以無法正式推薦使用，在此僅提供參考。

釀酒葡萄均不套袋，因此在近採收期可以5%「三泰芬」可濕性粉劑2,000倍，採收前6天須停止用藥。

農藥使用技術指導專欄



白肉檳榔樹苗

自種出售
現貨供應



樹苗粗壯優良，大小直徑均有
樹苗培植於開闊壤土農地
苗上不易鬆掉，移植容易

彰化縣田尾鄉仁里村40號
(048)888077

自動控制壓力 動力噴霧機

榮獲中央標準局專利，擁有八大特點新產品


水壓自動控制系統

自動控制液壓裝置
能自動節省能源

各地均有零售

多種機型·資料備索

服務專線：(04)3303108~10



常用壓力40kg/cm²



物理®

物理農業機械有限公司

台中縣霧峰鄉古峰村錦州路449號