

發。當覆蓋作物生長至某一厚度時，即可翻耕入土壤中。

#### 4. 施肥

通常在定植後1個月每棵施100~150公克硫酸銨，在6個月後或雨季將近停止時，再施同等量肥料，如果有機肥方便的話，則在樹周圍施有機肥更好。當樹長得更大時，化學肥料施用應增加。開始結果時，每一棵樹在雨季開始時施0.5~1.0公斤完全肥料，在雨季將近結束時，再施同等量肥料。隨樹變老，產量更多，施用之肥料需隨著增加。在充份成長之樹（15~20年以上），可能每次需施2~3公斤完全肥料。

#### 5. 剪枝

幼樹定植前須除去不必要之枝條及將每一片葉子剪半以減少蒸發。以後通常至結果前都不剪定。結果開始時期，剪定主要於除去樹內部小而無生產力的分枝，其他昆蟲為害之枝條也應除去。婆羅蜜在印度作為咖啡遮陰樹，特別整枝成5~8公尺高的單幹樹形，所有低於此高度的枝條一律除去，頂部則讓其分枝，以便遮陰。

#### 6. 繁殖

普通可用種子繁殖，因此為最便宜、容易的方式。但如此育出之植物會產生一些變異，致品質、形狀不同之果實產生。因此，較優良之植株應行無性繁殖。繁殖方法可以壓條、嫁接、芽接、枝接等方法。插枝法成功性很低，不值得採行。

### 病虫害防治

主要虫害為天牛及果蠅。控制天牛之方法

，為除去虫害枝條並加以焚毀。控制果蠅可收集被害果實，加以焚毀或利用幼果時套袋。幼果噴賽文或馬拉松可減少果蠅危害。病害方面主要為花序軟腐病。控制的方式為除去及燒毀其感病部分及噴洒波爾多。

### 主要用途

成熟之果實大約含25%果肉、10%種子、65%果皮及其他不可食部份。果肉通常作為餐後之甜食，果味芬芳甜美，放於冰箱冷卻後吃，可增加風味及脆度。還可作成蜜餞及其他甜點，也可作為冰淇淋之調味料，且可與水果沙拉混合，也可與可可椰子乳加糖滾過之調合物混合成味美之食物，此外也可發酵後蒸餾作為酒精、飲料。種子含有澱粉及烘烤後如蠶豆非常好吃，其他不能用之部份富含果膠可適於製造果凍。其木材可用於製造傢俱、建築材料、樂器。

## 白肉檳榔樹苗

自種出售  
現貨供應



樹苗粗壯優良，大小直徑均有  
樹苗培植於開闊壤土農地  
苗土不易鬆掉，移植容易

彰化縣田尾鄉仁里村40號  
(048)888077