

潤狀態，放置育苗室內。每天須注意澆水，不可太濕或過於乾燥。萌芽後以尿素500倍液追施，不宜增加濃度，否則產生肥害或枯死。在育苗過程中，可利用簡易覆蓋設施，最好是塔架網室，使用流滴耐侯塑膠布及噴灌設施。

育苗期病虫害管理需注意田蟪蠶食，以使用6%蝸立死粒劑撒於育苗床下或周圍，亦可使用石灰防止田蟪進入。並須注意夜盜虫之發生，幼虫嚼食葉肉，可使用達馬松乳劑1,000倍噴藥防治。經35~50天之育苗即可移植。

2. 移植

移植時，先做畦，畦面寬1.0公尺，株行距30×35公分，二行植，將苗移植於穴內，澆水保持適當土壤溫度。

3. 施肥

整地時施用基肥，每分地（10公畝）施用

腐熟雞糞300公斤。若土石灰120~150公斤，硫酸銨40公斤，過磷酸鈣70公斤，氯化鉀15公斤。追肥在生育期間至少施用3~4次，每次每分地尿素使用8~10公斤並稀釋500倍施用。爲了防止缺硼現象，可用硼砂泡溫水60~80℃使其溶化，再稀釋500倍施於植株四周。

病虫害防治

害虫方面：以夜盜虫之爲害最爲嚴重，幼虫往往鑽於植株之下方切斷幼苗，可用達馬松液劑1,000倍稀釋防治；害虫數量不多時，可在晨昏時刻挖掘植株四周之幼虫。到了1、2星期後，由於植株已高，幼虫無法切斷粗壯之基莖，偶有部份之幼虫駐留葉片，僅需適期防治或捕捉幼虫即可。

病害方面：以軟腐病爲主，可參照植物保護手冊。使用68.8%多保鏈黴素混合可濕性粉劑Atakin稀釋1,000倍防治。 ■

最佳植物活力劑—維他命的新應用
農業繁殖栽培業者的好消息!!

速大多[®]

START スタート

對任何植物苗的移植、插芽、插枝、高壓條……
具有迅速催芽、開根、增加活力的奧妙神速奇效!!

使用1,000倍液 · 用量省 效果大

* 精美彩色說明書備索 *
日本 Teaco inc. 製造

台灣總代理

台和園藝企業股份有限公司

台北市士林區中正路104巷1弄2號 Tel:(02)831-3302

