


- ①低垂的果實、枝條用竹竿架高。
- ②雨季園地排水力求暢通，成熟期土壤避免過濕
- ③剪除的病果與枯枝均需搬離果園燒燬，避免傳染。
- ④嚴重地區試噴35%「依得利」可濕性粉劑2,000倍，地面也需噴至。

(5)套袋後，果實仍有黑輪紋斑點出現，內部腐爛，如何防治？

本病屬於真菌性病害，病果初期在果實表面形成黃色小點，後斑點擴大轉成褐色，稍凹陷軟化，上生粉紅色微狀物，果實成熟，病斑擴大，甚至數個病斑融合在一起，造成果實腐爛，加速落果，影响品質，本病於高溫多濕季節發生最多，套袋後，袋內濕氣增加，也易促使本病的發生，病原菌具潛伏感染特性。防治方法：

- ①注意果園清潔，經常去除落果、落葉燒燬。
- ②多雨時期應加強防止病原菌的感染，可定期（1~2周）噴洒殺菌劑如「鋅錳乃浦」可濕性粉劑防治。
- ③果實不該留至較熟程度，應於軟熟之前即採摘出售。



(6)果實由底部開始變黑，逐漸向上蔓延，最後果實下半部變黑腐爛，應如何防治？

這是罹果腐病，一般發生於果實成熟期，由果實的臍部（底部）開始發病，黑色斑點向上逐漸蔓延，果肉腐爛，致果實下半部變黑，失去商品價值。防治方法：

- ①低垂的果實架高。
- ②田間排水力求暢通。
- ③試噴35%「依得利」可濕性粉劑 2,000倍；地面亦須均勻噴至。
- ④病果、落果均需搬離果園，以免傳染。
- ⑤塑膠袋底下開孔透氣。
- ⑥氮肥勿施用太多。

最佳植物活力劑—維他命的新應用
農業繁殖栽培業者的好消息!!

速大多®

START スタート

對任何植物苗的移植、插芽、插枝、高壓條……
具有迅速催芽、開根、增加活力的奧妙神速奇效!!

使用1,000倍液 · 用量省 效果大

* 精美彩色說明書備索 *
日本 Tesco inc. 製造

台灣總代理
台和園藝企業股份有限公司
台北市士林區中正路104巷1弄2號 Tel:(02)831-3302

