



# 豐原大葱—— 大又白！

豐原市農會 陳哲郎 羅慧錦

大葱於日據時期引進本省，在北部各地栽培，尤以新店為主產地。豐原當時也有零星栽培，數量很少。光復後始有人專業栽培，但總面積僅1~2公頃。去年以來由於價格看好，栽培面積增加到60公頃，今年初參加全省農特產品促銷活動大會，頗受各界的注目。

## 一・氣候土壤

①氣候：大葱生育適溫12~18°C；發芽適溫15~30°C，最適溫20°C。

②土壤：大葱適於表土深、排水良好的砂質壤土栽培。pH值在5.7~7.4的範圍內均可。

## 二・品種

採用金長品種。介於黑柄和赤柄的中間型品種，葉呈綠色，葉身直立不分蘖，葉梢部粗大，較早生，軟白部40~45公分，品質良好，產量高，耐運輸，耐高溫，適於本省栽培。播種期6~8月。

## 三・栽培管理

①育苗：每10公頃的播種量240~300公克，種子宜用蓋普丹或阿拉散0.3%拌種消毒，以防止由種子傳染露菌病。播種後以一次假植為原則。

選擇肥沃壤土，灌水方便的地方作苗床。播種後用完熟細碎的堆肥覆蓋，鎮壓覆草以保持土壤適溫，促進發芽。育苗日數50~60天。定植前10~14天停止澆水，以利苗株硬化，使定植後成活良好。

②整地及施肥：本田全面耕耘後作畦，大小依土

壤性質而異，如粘質壤土每隔75公分，砂質壤土每隔90~100公分為行距，挖掘寬度18~21公分，深度15~18公分的種植溝，再用鋤頭修整。畦向採東西向，以利採光及通風。

基肥用腐熟雞糞700公斤或腐熟堆肥1,200公斤，於整地同時撒施或施於植溝溝底。（植溝內為避免傷害根部，不施用硫酸銨和氯化鉀）

③定植：不分藥品種每隔5~6公分種一株；分藥品種每隔12公分種一株。植後覆草，以保持土壤適溫和抑制雜草發生。

④追肥：定植後10天新根發生時開始施追肥。第一次花生餅（或豆餅）60公斤，尿素8公斤，過磷酸鈣30公斤，氯化鉀8公斤。第二、三次每次尿素12~



縣政府農產運銷課人員到田間視察（廖春麟攝）

# 大葱插花

大葱可食用，亦可供插花之用。

這裡三張照片，是以大葱、大葱花、姬百合、魁百合、小蒼蘭、康乃馨、鳴子百合等為花材的草月流插花方式。大葱在整個配置中，非常突顯而有力。

這是示範的插法，各位可依自己的喜愛和匠心，變化出更多的設計。



16公斤，氯化鉀12~16公斤。

⑤除草：定植後3天，在行距間噴灑75%大克草可濕性粉劑600公克，加水200~300倍的稀釋液。

⑥培土：培土分3~4次，每次施用追肥時一併進行。培土不宜過厚，最後一次以不超過植株葉身部的分歧點為準。

⑦灌溉：大葱栽培之成敗，以灌水如何最為重要。一般以灌水深度在畦溝的七分為限。灌水後要迅即

排水。生長期中大約灌溉5次即可。

## 四・病蟲害防治

可參照植物保護手冊。

## 五・採收

約在種植後120天才能採收，要看生育情形、葉鞘部的軟白程度和市場供需而決定。