



發生爛尾症的紅尾蝦

做成機動調整。通常水溫較高時約 1 小時正好食畢為佳，天氣較冷時約 1.5~2 小時正好食畢為佳。

蝦的攝食時間，以傍晚及早上 6 點食慾最強，所以投餌時的安排上，最好不要錯過這兩次時間。

病害防治

紅尾蝦的疾病目前發現的很少，較易發生的有：

抽筋：全身或局部抽掣，彎曲而僵硬，不復伸直，最後死亡。

預防：1. 避免在高溫下捕蝦。

2. 減少捕蝦所造成的突然刺激。

爛尾症：尾扇潰爛，缺損或邊緣變黑，部份尾扇末端腫脹，內含液體。

防治：1. 四級銨類消毒劑 1~1.5ppm 藥浴一天。

2. 富來頓 10~20ppm，藥浴一天。

紅尾蝦養殖在風險、成本、時間上，比草蝦、斑節蝦都來的低，但缺點是在市場，價格的不穩定，活蝦運輸不易，今後若能開發外銷市場，及研究改進紅尾蝦的運輸方式，紅尾蝦養殖應具有相當大的發展潛力。

月後，則將餵食次數增為一天 4 餐。

投餌量的控制，應以「四角網」的經驗觀察最為實用有效，無論天候變化如何，底質、環境的變遷，蝦的健康及攝食程度，甚至蝦的脫殼時間長短，或池中蝦的成長並不確知等，都可以用「四角網」觀察，

果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找 台和!!

有機質 磷鉀肥

魚精 **開花肥**

0-10-10

促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳
花蕾肥碩、開花旺盛——釐果良好 結實大

美國ALASKA魚肥公司 出品

果樹·蔬菜用 **花寶 (HYPONeX) 系列!!**

花寶二號

20-20-20

促進果實肥大 糖度增加

花寶三號

10-30-20

促進開花 增加着果率 結實良好

美國The HYPONeX Co., Inc. 製造

葉面施肥·亦可混合農藥使用

◆詳細資料歡迎函索◆

地面撒佈
使用方便

〈最新奇 特殊土壤改良劑〉

——改善水果品質的秘方——

促進着色 提早成熟 糖度增加
強健植物生理機能 增強貯藏力

鈣元® CALGEN
カルゲン

日本製造

原裝進口供應

高單位鈣質
改善土壤
控制氮肥
防止徒長

——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——

台灣總代理
總經理

台和園藝企業股份有限公司

Taiwan Horticultural Co., Ltd.

台北市士林區中正路 104 巷 1 弄 2 號

台中連絡處：台中市三民路一段 164 號

郵政劃撥：0101360-9

電話：(02) 831-3302

電話：(04) 2223374