

台南縣南化鄉種植的



金線瓜及其縱切面(阿郎)

金線瓜又叫麵條南瓜、海蜇皮南瓜或金絲瓜。

金線瓜對土壤氣候的適應性強，尤其產量高、耐運輸、損耗小及耐儲藏為其最大優點。同時其收穫期正值雨季，可調節當時蔬菜之欠缺。另外其食用方法多，炒肉絲、炒肉片、配湯料、炸丸子、瓜排、攪絲涼拌及製作蜜餞皆可。

風土適應

1. 氣候：如經營得宜，本省氣候全年皆可種植，若計畫調節供求，4~5月種植，6~8月收穫青瓜，可紓解夏菜不足。第2季10~11月種植，可收老果

，食其肉絲或加工則別具價值。

2. 土壤：含沙率40%~60%最佳，山坡礫土亦佳，粘土過重，根部伸展受限發育欠佳。

栽培管理

1. 播種：第1期3~5月下種，6~9月收成。第2期為11~12月下種，翌年2~3月收成。

2. 施肥：施用有機基肥每公頃2,000公斤，分普施穴施2種，前者耕耘打入，後者掘穴混合。每隔15天追肥1次(計2次)5號肥2次共20包。如不用基肥，種苗1周後，距苗根10公分環施少許(1湯匙)。



開花結“瓜”了！

採收

- 種植後55天即可採食鮮瓜（菜用），可連續40天
- 加工果則需90~100天。每公頃 2,500~2,700株計
- 正常產量達2萬~3萬公斤。



做為鮮瓜用的金線瓜，種植期55天即可採收。

收益

每公頃單位產量27,000~48,000公斤，每斤10元計，每期獲利27~50萬元，除去成本，淨利18~40萬元之間。



果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!		◆ 詳細資料歡迎函索 ◆	
葉面施肥·亦可混合農藥使用	<p style="text-align: center;">有機質 磷鉀肥 魚精 開花肥 0-10-10</p> <p style="text-align: center;">促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳 花蕾肥碩、開花旺盛——釐果良好 結實大</p> <p style="text-align: center;">美國ALASKA魚肥公司 出品</p>		
<p style="text-align: center;">果樹·蔬菜用 花寶 (HYPONeX) 系列!!</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>花寶二號 20-20-20</p> <p>促進果實肥大 糖度增加</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>花寶三號 10-30-20</p> <p>促進開花 增加着果率 結實良好</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">美國The HYPONeX Co., Inc. 製造</p>			
地面撒佈 使用方便	<p style="text-align: center;">《最新奇 特殊土壤改良劑》 ——改善水果品質的秘方——</p> <p style="text-align: center;">鈣元 CALGEN カルゲン</p> <p style="text-align: center;">促進着色 提早成熟 糖度增加 強健植物生理機能 增強貯藏力 日本製造 原裝進口供應</p>		高單位鈣質 改善土壤 控制氮肥 防止徒長
<p style="text-align: center;">——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——</p> <p style="text-align: center;">台灣總代理 總經理 台和園藝企業股份有限公司 Taiwan Horticultural Co., Ltd.</p> <p style="text-align: center;">台北市士林區中正路104巷1弄2號 台中連絡處：台中市三民路一段164號</p> <p style="text-align: right;">郵政劃撥：0101360-9 電話：(02) 831-3302 電話：(04) 2223374</p>			



病虫害防治

1. 病害

1. 根腐病：幼苗兩大葉伸張後，根部嬌嫩，受風吹搖動根部易斷裂因而腐爛。

防治：用樹枝插於苗之順風兩側固定。噴酒四氧丹600倍或億力1,000倍預防。

病株清除，補苗充實。

2. 枯黃病：葉面起綳變厚，周邊漸黃，幼果畸形，整株末稍萎縮。

防治：種前植穴洒磷酸鈣配富瑞松，或加保扶粒劑。

3. 霉病：2~3月晨間多露水或霧，成果一行左右時易患，即絨毛白粉病。

防治：未發生前，可以用可利生4倍預防。瓜纏老時即全面發生，可集而焚。

2. 虫害

1. 蚜虫：移植2~4周時，易患，翌年12~1、2月間尤甚，可以巴拉松、大滅松或萬靈滅殺。

2. 青虫：綠色如螟，可突發於1周內吃光所有葉片，以巴拉松千倍殺滅。

3. 果蠅：大滅松1千倍，于著果當日噴施，收花後（午後）即套袋保護。

注意事項

1. 氣溫在12°C~20°C之間時，若進行人工授粉，須在白天6時半~10時前完成。

2. 7°C下不開花。

3. 每株結果數，株勢強者也不宜超過7果。


農林廳肥料登記證：農肥字第0195-1號

●日本トモ工化學工業株式會社原裝進口●

皇國[®]肥料系列產品

●葉面特效營養劑 土壤改良有機聖肥

改良土壤結構 增進根群活力 促進花芽分化
增加產量 提高品質



台灣區總代理：
皇國貿易有限公司
台中市大雅路473之4號

經銷處：
全省各農藥行及服務站