



病虫害防治

1. 病害

1. **根腐病**：幼苗兩大葉伸張後，根部嬌嫩，受風吹搖動根部易斷裂因而腐爛。

防治：用樹枝插於苗之順風兩側固定。噴酒四氧丹600倍或億力1,000倍預防。

病株清除，補苗充實。

2. **枯黃病**：葉面起綹變厚，周邊漸黃，幼果畸形，整株末稍萎縮。

防治：種前植穴洒磷酸鈣配富瑞松，或加保扶粒劑。

3. **霉病**：2～3月晨間多露水或霧，成果一行左右時易患，即絨毛白粉病。

防治：未發生前，可以用可利生4倍預防。瓜纏老時即全面發生，可集而焚。

2. 虫害

1. **蚜虫**：移植2～4周時，易患，翌年12～1、2月間尤甚，可以巴拉松、大滅松或萬靈滅殺。

2. **青虫**：綠色如螟，可突發於1周內吃光所有葉片，以巴拉松千倍殺滅。

3. **果蠅**：大滅松1千倍，于著果當日噴施，收花後（午後）即套袋保護。

注意事項

1. 氣溫在12°C～20°C之間時，若進行人工授粉，須在白天6時半～10時前完成。

2. 7°C下不開花。

3. 每株結果數，株勢強者也不宜超過7果。 ■


農林廳肥料登記證：農肥字第0195-1號

●日本トモ工化學工業株式會社原裝進口●

皇國[®]肥料系列產品

●葉面特效營養劑 土壤改良有機聖肥

改良土壤結構 增進根群活力 促進花芽分化
增加產量 提高品質



台灣區總代理：

皇國貿易有限公司

台中市大雅路473之4號

經銷處：

全省各農藥行及服務站

最新型
芒果催早花尖兵