

放養

放養密度目前尚無一定基準，但由於烏賊的侵食性高，所以放養時必須先考慮大小分池，即同一池的烏賊必須體形相等，才可減少侵食的情形。又密度低攝餌量減少，而密度高侵食攻擊時常發生。

放養時，也須注意族群性，如池中族群攻擊後來族群的情形，大形族群侵食小形族群等等。

給餌

烏賊的餌料以魚肉及蝦肉為佳，活餌又優於死餌。烏賊在餵食時最怕驚嚇，所以必須以投餌式來餵食，並要慢慢投食，如死餌沉於池底，烏賊就不再攝食，而死餌又易使水質變敗。如以活餌餵食，則除水質不易變敗外，攝食正常增肉率高，侵食死亡減少，但成本高。

通常每日的投餌量為體重的10~15%，每日投飼2~3次。魚肉是小魚時整尾投飼，大型魚肉則需切成適當大小的肉塊後再行投飼。

一般管理

烏賊在池中養殖最易發生互相侵食的現象，尤以體重比在10比1以上者最易發生。所以需將大小不同者分開飼育為佳。

烏賊養殖最適條件為水溫在20~30°C之間，鹽分在30‰左右，如在水溫20°C以下則攝餌量減少，15°C以下時有死亡現象，而鹽度降至含d量12‰以下時，捕食停止。

飼育時，池水必須保持轉動，水池中放置一些如石頭、岩塊、人工物等，並需加遮蓋或加高堤頂，以防烏賊跳出。由於烏賊有偏食性，對食物有甚高的選擇性，所以烏賊死亡的最大原因為饑餓所致。

活存率

烏賊由20~30公克重者開始飼育，至達半公斤的上市體型，約3個多月。其活存率約65~70%間。

由於烏賊養殖經營的利潤相當高，可見其企業化經營甚有發展前途。尤其在台灣東北部或東部等海岸，本為烏賊良好生息場所，如能利用海岸的岩盤上圍築堤岸，抽起海水進行養殖，將更為經濟。 ■




利谷

利谷自動噴霧農藥


全國唯一專業化，設計、施工、製造一體化之自動噴霧製造商

適用於柑橘、梨子、蓮霧、芒果、楊桃等作物全自動噴霧農藥、噴水，及香菇、花卉、蔬菜澆水加濕作業。

- ※全省各地區示範區已完成
- 歡迎來電安排參觀
- 詳細資料備索



噴霧實況：霧化細細，附著率強，藥量減少。



行政院農業委員會
台灣省農林廳輔導
台東改良場開發

農友有話要說：

台南白河南賽吳石津農友說：

「我去年柑柑一年完全採用利谷自動噴霧，成果比人工效果還要好，藥量又少，真理想。」

台南東山青山鄭秋景農友說：

「使用利谷自動噴霧設施管理，不但病蟲害防治效果優越，且對於水果品質更能提高。」

台中東勢石城傅文亮

農友說：「我裝設利谷自動噴霧於柑橘園，從此不再有農藥中毒的機會，祝大家身體健康，萬事如意。」

利谷有限公司

嘉義縣竹崎鄉灣橋村1之204號 電話：(05)2769027