




梅樹種植距離 8~10公尺為宜

問 (1)烏梅(酸梅)是何季節栽植?在山坡地種植應用何種方式?行株距大概多少?


(2)有無已接枝過的種栽,應向何處購買?根部包土是否比較容易成活?(高雄縣大樹鄉九曲村九曲路28號林金虎)

答 (1)梅樹的種植期,通常在11月底~12月初。部分地區氣溫較高,發芽較早,可稍提早半個月種植。

種植距離,行株距以8~10公尺為宜。但是幼樹期可以4~5公尺的距離種植,甚至再密一點,可以2公尺1株,但是以後要間伐,樹形逐漸擴大,逐漸砍去「間伐樹」,最後的距離是8~10公尺1株。「密植」可以提早採收,收回成本。

山坡地應該採「等高線」種植,二行留一行「作業道路」,以便將來運搬及採收之用。

(2)梅樹多以「實生種」種植較多,種苗可向梅農預約。種植時,根部不需包土,但須挖「植穴」,寬



(廖敏卿攝)

1公尺、深1公尺,並放入堆肥,種植容易成活。(曾逢星)

九重葛嫁接 接穗宜用1年生枝條


問 (1)九重葛為何不開花?
(2)九重葛嫁接,如何選取接穗?

(3)靠接是否比較容易成活?時期為何?(斗六市嘉東里劉厝路10號江中景)

答 (1)九重葛不開花有下面幾個原因:①生長過於繁茂(如葉片肥大、葉色濃綠、枝條繁密,或徒長枝形成),往往不易開花。②水分過多。一般九重葛(盆栽或庭園栽植)待土壤表面呈現乾燥現象時,才給予充足的水分,可促進開花,否則土壤過於潮濕時,不開花。③光線不充足時,不易開花。

(2)嫁接時,接穗宜用新嫩枝(1年生),易成活,勿用老枝條。

(3)靠接成活率比較高,適期為3~10月。(蔡福貴)



(阿郎攝)

製作冬瓜露 須長時間熬煮

問 市面上有1種冬瓜塊,用於溶解成冬瓜茶,不知它的製法如何?此種技術是否可運用在其他產品上?(嘉義縣梅山鄉圳北村6鄰5號李坤霖)

答 (1)冬瓜塊又稱為冬瓜露。加工方法為,選取成熟的冬瓜,用刨刀削去外皮及裏面柔軟部分,然後輪切成長度3~4公分,厚度5~6公分的果肉,經洗滌後,放入鍋內加入二級砂糖及少量水,略加混合,即加熱煮沸熬煮,並時時用木瓢攪拌,以防止

承租人放棄耕作

新竹市集賢街18號潘諭爵先生問：
田地佃農現休耕，且佃農已70多歲，
是否可收回自耕？

高瑞錚律師答覆：

承租人放棄耕作權時，出租人得為終止租約，
收回耕地，而所謂耕作權利之放棄，除承租人向出
租人以意思表示為之者外，「非因不可抗力繼續1

法律問題

地主可收回耕地

年不為耕作者」，亦視為放棄耕作權利
，土地法第114條第2款、115條、耕地
三七五減租條例第1項第2款著有明文
。本案須視佃農是否構成上開放棄耕作
權的情形，若然，可向當地鄉鎮市區公所耕地租佃
委員會聲請調解，請求收回耕地。至於佃農年邁，
尚非出租人得終止租約的原因。

鍋底燒焦。然後改用小火繼續加熱，至冬瓜糖漿液滴
入水中能凝固成塊狀時即停火，倒入另一成型容器內
，待冷卻即成固體冬瓜露，然後切成方塊即得成品。

(2)冬瓜露的加工在一定時間內，愈熬煮愈有香氣
，若使用其他材料代替者，必須找不含酸的中性材料
，且長時間煮沸後，不影響成品風味的材料為原則。
(黃本田)

桶柑氮肥太多 果實品質差

問 4年前，我在台北縣石門鄉種一些桶柑，今年
收成。但是不知為什麼果皮很厚，且吃起來味
道很淡。請問要施什麼肥，才能改善？(台北市北投
區大同街202~5號潘金田)

答 可能原因有：(1)氮肥施用太多，生長過於茂盛
，使果皮較粗厚，着色不良，且果味較淡薄。
其施肥方法為，5年生桶柑，每年可在春肥施用台肥
五號0.5公斤，而在夏肥施台肥二號0.2公斤，和秋肥
施用台肥二號0.3公斤，因此種肥料含氮量較低，含
磷鉀肥較高，可使果皮較薄，着色好，且含糖量增高
。(2)你種的桶柑剛過幼年期，當開始結果2~3年，
果皮均較粗厚，樹齡大後果皮即會變薄。(藍調)

雉雞留種 2~5齡最適

問 (1)雉雞種蛋孵化率為何偏低？
(2)雛雞孵出後，多久餵料，才可減低死亡率？
(3)種母雉背部為什麼會受傷？如何治療？

(4)雉雞有那些疾病？

(5)種雉可使用多少年？(高雄縣路竹鄉文南村永
福路76巷12號林天恩)


答 (1)影响雉雞孵化率的因素包括種雉雞的年齡、
飼料、種卵的貯存、遺傳因素及健康等。初產
種蛋孵化率低，通常初產後第2~3周內的種蛋不孵
化，因其孵化率低，幼雛生長不好，蛋小幼雛也小，
等產蛋率正常或高峯時，孵化率最佳。

(2)提早於孵出後12、24或36小時內餵料，可使育
雛早期的總死亡率降低2.5、2或1%，由此可見愈
早餵料，愈可減少因衰弱而死亡的雛雞數。飲水中可
加入可溶性抗生素或維生素，效果較佳，雛雞充分飲
水後，隨即餵料，切記雛雞未充分飲水之前，在乾渴
脫水的狀態下餵料，反而易因食滯而增加死亡率。

(3)背部受傷的種母雉應立即治療，擦碘酒或油質
盤尼西林。因配種期公雉體重比母雉大，自然配種致
母雉背部受傷，可改用人工授精。

(4)雉雞疾病有新城雞瘟、雞痘、雞腦脊髓炎、雞
白痢及啄毛癖與食血癖等。

(5)種雉留種適齡為2~5年，平時不良種雉即應
淘汰，淘汰與死亡雞隻比率每月超過0.75%，即應檢
討防疫措施與飼養管理方法。(唐清苓)



(張瑞卿攝)