


種健康苗 可抑制為害

本場曾於草莓採收末期作調查：發現呈現萎凋病徵的植株約為1.44%，但若作解剖檢查，維管束褐化的比例高達 32.25%，顯示本病具有潛伏感染的性質。罹病田，若以高冷地育成的健康苗來種植，定植初期，全無青枯病發生，翌年 5 月間再作解剖檢查，感染率則降為 .62%，第 3 年又降為 5.93%，顯示應用健康 11 苗作為種植材料，即可抑制青枯病的為害。

潛伏期 長達10個月

草莓青枯病的潛伏期，根據報告可達10個月以上，因此在生育期間遭受感染的植株，極少出現萎凋病徵，對草莓之生產影響極微。但是若將外觀正常，已受感染的草莓，當作留苗母株時，其形成的幼苗(Runner) 約有40%左右，已帶病原細菌，此等帶菌種苗定植於田



間之後，萎凋病徵馬上出現，而造成早期幼苗的大量死亡。

罹病田 不可再作育苗圃

青枯病為害的草莓園，以健康苗種植即可避免定植初期的幼苗萎凋，種植健康苗2 年之後，感染率下降為5.93%，但是恢復現地留苗，隔年的感染率又劇昇為40%以上，因此一旦發生青枯病之後，罹病田即不適合再作育苗圃，下期所需的種苗，一定要另外擇地培育。■

中央標準局認定第88958號

活肥源

鎂肥要素

精製蚵殼灰

超級紅苦土

和春

和春化工股份有限公司
台中市文心路二段596號
TEL: (04) 3260751-3260752
說明書來函即寄

施用

功效
成果

洋菇專用鈣
輕質碳酸鈣

改良酸性土壤
補充微量元素
促進土地肥力

提高品質

增加產量

提高糖分香味

誠徵經銷商