

藥劑名稱	使用範圍		使用方法		
	作物名稱	害虫名稱	稀釋倍數	每次公頃每量	施藥時期及方法與注意事項
畢芬寧25.1%乳劑	茄子	茄子二點葉蟊	6,000倍	0.1~0.2公升	(1)葉蟊發生時間開始施藥，隔7天，再施藥1次。 (2)採收前6天，停止施藥。
畢芬寧25.1%乳劑	甘藍	紋白蝶	6,000倍	0.1~0.2公升	(1)每隔7天，施藥4次。 (2)採收前9天，停止施藥。
畢芬寧25.1%乳劑	蘋果	二點葉蟊	5,000倍	0.4公升	(1)葉蟊密度在每葉5隻時，開始噴藥，7天後再施藥1次。 (2)採收前10天，停止施藥。
畢芬寧2.8%乳劑	桃	桃蚜	1,400倍	0.7公升	(1)蚜虫發生時，施藥1次。 (2)採收前10天，停止施藥。
畢芬寧2.8%乳劑	柑桔	潛葉蛾	1,000倍	2公升	(1)新芽萌發時，每隔7~10天施藥1次，連續2~3次。 (2)採收前20天，停止施藥。
畢芬寧10%可濕性粉劑	茶	神澤氏葉蟊	1,250倍	0.8公升	採收前15天，停止施藥。

使用農藥，先看標示說明，注意採收前停止用藥日數，以避免農藥殘留。

施藥時注意風向，戴口罩，穿保護衣褲，避免身體受害。

台灣省政府農林廳

**最佳植物活力劑—維他命的新應用**

**農業繁殖栽培業者的好消息!!**

# 速大多®

## START 24-h

對任何植物苗的移植、插芽、插枝、高壓條……  
具有迅速催芽、開根、增加活力的奧妙神速奇效!!

**使用1,000倍液·用量省 效果大**

\*精美彩色說明書備索\*  
日本 Teasco inc. 製造

台灣總代理  
**台和園藝企業股份有限公司**  
台北市士林區中正路104巷1弄2號 Tel:(02)831-3302

