




平板式平面菌生產情形



蠶架四周撒上防蟻粉，可防止蟻害

9. 上簇室溫低於 20°C 而相對濕度高於 85% 或低於 65% 時上簇：會產生破風尖頭菌。

10. 上簇時室溫超過 30°C 且相對濕度超過 85% 時，會引起同宮菌、簇印菌、多重菌和裸蛹等不良菌。

11. 上簇時遭受強光照射或強風吹襲 會產生同宮菌、棉菌和多重菌等不良菌。

不良菌的預防方法 徹底做好各項消毒作業

1. 蠶室蠶具消毒：

(1) 目前都採用 30% 福馬林 (Formalin 即甲醛水溶液)，效果良好，為增進其浸透和擴散性，可在福馬林液中添加 0.2% 的界面活性劑 (如 Alipand)。用量為地面每 3.3 平方公尺噴 3 公升 (包括天花板及牆壁等)。

(2) 不怕水的蠶具可先洗淨，搬入蠶室一併消毒。

(3) 為達到消毒效果，消毒後之蠶室溫度應保持在 20°C 以上，並密閉超過 24 小時，始打開充分通風乾燥。

(4) 蠶室外地面也常有病原，同時應在每 3.3 平方公尺泥土地噴 5 公升，水泥地噴 1 公升消毒液。

(5) 飼養中的蠶室外，應備以高效漂白粉 (含有效氯 70%) 稀釋 200 倍製成之漂白粉水供工作人員洗手和浸鞋子。此水並應隨時更新，以保持足夠消毒力。

(6) 病死蠶是病原主要的來源，應以筷子夾入放有漂白粉的病蠶盒裏，集中掩埋。

(7) 養蠶結束，應立即清除蠶室蠶具，再實施消毒作業。

2. 蠶體蠶座消毒：

主要目的是在防止經由皮膚傳染的殭病，目前進口的這類粉狀消毒劑有 Pofusol、Kabinoran、Kinubon 等，而蠶改場研製的防殭粉，效果不錯且便

信用的標誌 品質的保證



各種產品
詳細資料
歡迎洽索

棉仔粕 菜仔粕 蓖麻粕

含有成分：
氮 4.5-5.5%
磷 2.5-3.0%
鉀 1.5-2.0%
有機物 87%

適用作物：
各種果樹、蔬菜、
豆類、花卉

含有成分：
氮 5%
磷 2.06%
鉀 1.30%
有機物 80% 以上

適用作物：
各種果樹、蔬菜、
豆類、花卉

印度原裝進口

含有成分：
氮 5.5-6.5%
磷 2.8%
鉀 1.2%
有機物 82%

適用作物：
各種果樹、蔬菜、
豆類、花卉

六和化工公司

台北市中山北路三段 47 號 7 F
TEL: (02) 5954321 (轉農業部) · (07) 8717881
(04) 2545821 (轉農業部)